

商洛肉鸽 济宁兴利正规公司 肉鸽厂家

产品名称	商洛肉鸽 济宁兴利正规公司 肉鸽厂家
公司名称	济宁兴利展览展示服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市嘉祥县梁宝寺镇
联系电话	13365473210

产品详情

技术要求

场地的选择

对于初养的家庭养殖户来说，一般以养殖100对种鸽为宜，占地面积约35~40平方米，除利用闲旧房舍外，也可搭建部分简易鸽舍。鸽舍用尼龙网遮盖后放养配对前的青年种鸽。生产种鸽采用笼养方式，鸽舍应冬天保温，夏季通风、防暑。

配对前的准备工作

无论是公鸽还是母鸽，体格要健壮均匀。每天饲喂2次，每次让鸽吃成饱，并供给充足清洁的饮水。在配对前10天左右，用一定的进行的预防，并驱除鸽体内外。保持鸽群每周洗浴1次，洗浴时可在水中加入适量的，以杀灭体外。根据所饲养肉鸽的数量，准备好笼具以及相配套的食槽、水槽、保健砂杯和产蛋巢。储备好足够的饲料和常用的。在进鸽前1周，用和高对鸽舍进行熏蒸消毒，并对舍外环境清扫消毒。

配对方法

根据鸽子固有的特性，将分栏饲养至6月龄的后备青年鸽进行配对。配对的方法有两种：

3.1自然配对就是将公母后备青年鸽混合饲养，让其自由配对繁殖。

3.2人工配对就是将分开饲养的后备青年鸽，人为地按公鸽品种、羽色、体重有规律地上笼，商洛肉鸽，使其熟悉舍内环境，2~3天后，用同样的方法把母鸽放入笼内进行配对。在正常情况下，公母鸽相互接触2~3天就会配对成功。

疾病防治

蛔虫病

蛔虫病的病症表现患鸽消瘦，垂翅乏力，呆立不动，黏膜苍白，与拉稀交替，粪中带有血或黏液。羽毛松乱，趾部浮肿。啄食羽毛或异物，食欲不振，有时出现抽搐及头颈歪斜等神经症状。生长速度、生产性能等明显下降。

蛔虫病的防治方法是应搞好平时鸽舍的清洁卫生，及时清除粪便，避免鸽与粪便接触，确保饲料和饮水卫生；鸽舍、食槽以及饮水器等要每天清洗，定期消毒；童鸽与成鸽分群饲养，定期驱虫，肉鸽价格，童鸽每2~3个月全群驱虫一次；成鸽每年驱虫一次。

禽出败(禽)

1.症状:病鸽发烧、脚冷，羽毛松乱，饮水频繁，口中流出黄色油脂状粘液，伴有下痢，体质瘦弱，急性者有时会突然，病程2~3天。

2.防治: 肌肉注射20%钠1毫升，每天2次，连注2~3天。 口服链片水溶液，每天2次，每只每次10万单位，连服2~3天。 大蒜3份，花生油2份，硫磺1份，捣碎混合，每只鸽灌服黄豆大1粒，每日2次，连喂1~2天。 病鸽隔离，用20%石灰乳或5%来苏儿溶液对鸽舍、用具及周围环境消毒。 每年进行1~2次禽出败注射。40日龄以上每只注射2毫升。

嗉囊积食

1.症状:鸽子嗉囊积食时，主要表现食欲废绝，精神沉郁，肉鸽养殖，嗉囊中食物结团。造成此病的主要原因是由于鸽子过度饱食，饵料不能及时送入胃中而停滞在嗉囊中。

2.:可用2%的盐水给鸽子灌服，随即用手轻揉嗉囊中硬块，使嗉囊中食物软化。反复几次，便可。经灌盐水后如不，则必须将嗉囊开刀取出积食，然后将刀口缝合，数日即愈。

羽虱

1.症状:羽虫多寄生在鸽翅膀羽轴边和羽毛之间，以羽毛浮皮为食，故对鸽子的健康影响不太大。但当羽虫在鸽羽毛中爬动时，会影响鸽子的情绪，使鸽子焦躁不安。

2.:本病多由于鸽舍潮湿不卫生引起，可用除虫菊撒于羽毛之间，每天1~2次，撒2~3次，即可痊愈。

我们总结出肉鸽防疫经验：一般来说，当对一定区域内75%-80%以上的鸽子实行了预防接种后，那么该地区的整个鸽子群体就有可能形成一道屏障，而使鸽群的多数群体获得保护。因此，对鸽子注射是为防范鸽子受到疾病，是养鸽成功的关键技术之一。然而，对于很多新兴的肉鸽养殖场来，防疫机制不够完善，技术不够过关，在注射时存在很多问题。鸽子注射时的八大禁忌，希望对广大同行有所帮助。具体如下：1、皮射忌用粗针头。粗针头注射大，易造成药液外流，影响治果，一般采用7号针头为宜。2、腿部注射忌打内侧。因鸽子腿上的血管、神经主要是从内侧行走，在腿内侧打针稍有不慎，易造成血管、神经损伤，轻者出血、瘸腿，重者瘫痪等。应选择外则注射。3、胸肌注射忌垂直刺入。由于鸽子的胸部肌肉相对较薄或针头过长，垂直刺入容易穿透胸膛，将药液注入胸膛，引起。要顺着龙骨方向由后向前入针。4、用药量大时忌一点注入。一点注入较多会影响吸收，应分多点注射。5、刺激性较强的忌在腿或翅膀上打针。由于刺激性较强的吸收慢（如油乳剂），会引起腿或翅膀长期疼痛，造成动步或飞行不便，影响觅食、运动及生长发育。一般不要选用这类，如果必须要用，应选择在胸部肌肉注射。商

洛肉鸽-济宁兴利正规公司-肉鸽厂家由济宁兴利展览展示服务有限公司提供。济宁兴利展览展示服务有限公司 (www.jnxingli.com) 是从事“济宁兴利展览展示服务有限公司”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。