

阳泉樱桃树苗 临朐樱桃苗销售 大樱桃树苗品种

产品名称	阳泉樱桃树苗 临朐樱桃苗销售 大樱桃树苗品种
公司名称	临朐城关街道西坦林果站
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县县城民主路北首秦池酒厂后西北角
联系电话	13853676013

产品详情

防治樱桃苗叶部穿孔病的方法：

- 1、加强栽培管理，增施有机肥避免偏施氮肥。及时排水合理修剪，降低果园的湿度，使其通风透光好。
- 2、秋后结合修剪，彻底清除枯枝落叶等，集中烧毁。
- 3、单独建园，不要与桃、李、杏等核果类果树混栽，以防相互传染。
- 4、药剂防治：发芽前喷5波美度石硫合剂或1：1：100倍式波尔多液，发芽后喷72%农用链霉素可湿性粉剂3000倍液或硫酸链霉素4000倍液。还可以用叶枯唑20%可湿性粉剂或辛菌胺醋酸盐进行防治。

甜樱桃是适宜在土层深厚，土质疏松，透气性好，保水力较强的砂壤土或砾质壤土上栽培。在土质粘重的土壤中栽培时，大樱桃树，根系分布浅，不抗旱，不耐涝也不抗风。樱桃树对盐渍化的程度反应很敏感，樱桃树苗销售，适宜的土壤pH值为5.6~7，因此盐碱地区不宜种植樱桃。樱桃很容易患根ai病，土壤中有根ai病菌及线虫则容易传染根ai病。种植樱桃、桃、李、杏的老果园，土壤中根ai病菌多，不宜栽植樱桃树，更不宜作为发展樱桃的苗圃。如果树苗有根ai病，将引起更严重的后果。

樱桃的根系一般比较浅，抗风能力差。严冬早春大风易造成枝条抽干，花芽受冻；花期大风易吹干柱头粘液，影响昆虫授粉；夏秋季台风，会造成枝折树倒，造成更大的损失。因此，在有大风侵袭的地区，一定要营造防风林，或选择小环境良好的地区建园。

种植大樱桃苗的气候要求：

大樱桃苗虽然是一种比较广泛的植物，但也不是所有地方都适合其生长的。大樱桃喜温喜光，生于山坡阳处或沟边，适宜在海拔300~600米，北纬33 - 39度左右栽培种植。怕涝怕旱，大樱桃忌风忌冻，适合于年平均气温 10-13摄氏度以上，早春气温变化不剧烈，夏季凉爽干燥，雨量适中，光照充足地区栽培。暖温带东亚季风型大陆半湿润性气候，年气温适中，雨量充沛，无霜期长，大樱桃树苗品种，终霜期早，阳泉樱桃树苗，年平均气温12度左右，降雨700余毫米，无霜期250天左右，适宜大樱桃栽培。

一般符合上述要求就可以广泛种植大樱桃苗。

樱桃树苗的环剥注意要点：

- 1、环剥对象.环剥对象应是生长旺盛的植株的主枝或枝组.通常以处理主枝、枝组为主，不剥主干.同株树的主枝、枝组环剥量应控制在1/3左右，避免营养失衡而死亡.中庸树或偏弱树不环剥.
- 2、环剥时期.环剥的最jia时期一是在櫻桃花后15天左右进行，此时植株功能叶占80%以上，具备一定的光合能力，能截流光合产物用于果实生长，既能提高坐果率和果实品质，又能明显促进愈伤组织形成;二是在采果后至7月底前进行，此时环剥可控制旺长，促进花芽的形成.
- 3、环剥方法.环剥宽度一般为被剥櫻桃主枝或枝径直径的1/10，剥时应在枝上选平滑部位进行.剥口要求平滑，宽窄可不一致，这样窄的部位能先愈合，避免出现树叶退绿，树势衰弱等现象.注意剥后不可触摸uo露的木质部表面，剥后即用塑料薄膜包扎，以防日晒、雨淋.

阳泉櫻桃树苗-临朐櫻桃苗销售-大櫻桃树苗品种由临朐城关街道西坦林果站提供。临朐城关街道西坦林果站（www.yingtaoshumiao.com）是山东 潍坊,花木的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在临朐櫻桃苗领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创临朐櫻桃苗更加美好的未来。