

新品种草莓苗出售批发，红颜草莓苗什么价格

产品名称	新品种草莓苗出售批发，红颜草莓苗什么价格
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	.30/棵
规格参数	品牌:创隆园艺 高度:30 产地:山东
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

红颜草莓有哪些生长特性?红颜草莓苗又称红颊，是日本静冈县用章姬与幸香杂交育成的早熟栽培品种良种。红颜草莓根系生长和吸收能力强，休眠浅，可抽发4次花序。其果实大、产量高、口感好、产量高、口感好、是设施栽培理想的更新换代新品种。创隆园艺场就来说说红颜草莓大棚栽培技术。

1 育苗

育苗时，要采用脱毒种苗或避雨育苗法;繁苗母株选用脱毒原种苗，或上年预留的无病健壮育苗专用母株;用于生产株作繁苗母株，选

取无病虫害、生长势强的植株。

大田避雨育苗法：避雨育苗，可以防止雨水直接冲刷，同时还切断了土壤里的病菌孢子随飞溅的泥水向地上部侵染的传播途径，可有效防治草莓炭疽病、疫病的发生。

1.1 整地

6m宽大棚整成2-3畦，每畦两侧各栽1行草莓，草莓种植植株距离为30-50cm.

1.2 覆膜、铺设滴灌设备

草莓种植过程中，要尽早覆盖薄膜避雨，防治病菌感染。

草莓种植要铺设滴灌补水，千万不要使用水龙头喷浇。

1.3 育苗期管理

及时整理诱引匍匐茎、摘老叶，松土除草。

如果草莓出现无根苗，则要及时重新培土种植。

1.4 病虫害管理防治

1.4.1 蚜虫

选用吡虫啉类防治，如质量分数为10%吡虫啉2500-3000倍液。

1.4.2 红蜘蛛

选用哒螨酮、炔螨特类，如用质量分数为15%哒螨灵1200倍液，或57%炔螨特2500倍液，或在防治时混加99%绿颖300倍液防治。

1.4.3 斜纹夜蛾

用质量分数为0.2%福达甲唯1500倍液，或52.2%农地乐1000倍液，或48%乐斯本800倍液，或5.7%百树得800倍液喷雾防治。

1.4.4 白粉病

发病期及时用质量分数为40%氟硅唑乳油4000倍液，或用12.5%腈菌唑乳油1500倍液进行喷施防治。

1.4.5 炭疽病

发现病株，清理植株感病部位后，选用质量分数分别为25%凯润1500倍液喷施或浇根，或25%咪鲜胺乳油1500倍液，或80%喷克可湿性粉剂400-600倍液、或50%速克灵乳油800倍液，或75%百菌清可湿性粉剂600倍液喷洒防治。

1.4.6 黄萎病

避免使用感病植株作育苗母株;避免苗地土壤过干或过湿;发现病株，及时拔除。

2 定植壮苗

2.1 整地作垄，土壤消毒

采用太阳能高温消毒的方式，具体的操作方法为：壤深翻，施入有机肥或结合秸秆碎屑，然后浇透水，土壤表面覆盖地膜或旧棚膜;使用腐熟有机肥做基肥，用量为3500-4500kg/0.067hm²，另加磷肥35kg，钾肥20kg;施肥后深翻土壤，做垄，以高垄栽培，垄面宽45-50cm，沟底约35cm，垄高25cm以上。

2.2 定植

8月20日-9月5日前定植，每亩地定植6500-7000株，每垄双行种植，种植行距为20cm，种植为株距16-20cm，栽植后浇透水。有条件的可以覆盖遮阳网，遮阳3-5天。

3 定植后管理

3.1 肥水管理

定植后经常及时浇水、浇小水，喷施防治炭疽病的农药;植株活棵后，及时去除老叶、病叶、病株、死株;补种的生产苗，要注意及时浇水，缩短缓苗时间;根据植株生长情况进行滴灌浇水，以“湿而不涝，干而不旱”为原则;根据植株长势合理追肥，与灌水结合进行。

3.2 植株管理

发育过程中，及时摘除匍匐茎和黄叶、枯叶、病叶;及早疏除花序上的无效花、无效果;始花前5天搬入蜂箱，每亩棚室放入2箱蜜蜂，放蜂一直延续到3月中下旬。

3.3 病害防治

草莓主要病害有炭疽病、白粉病、灰霉病等，具体防治措施如下：

炭疽病：用质量分数25%咪鲜胺乳油1500倍液，或80%喷克可湿性粉剂400-600倍液，或50%速克灵乳油800倍液，或75%百菌清可湿性粉剂600倍液喷洒等进行防治。

白粉病：用质量分数为40%氟硅唑乳油4000倍液，或12.5%腈菌唑乳油1500倍液防治。

灰霉病：适时放风换气，及时采收;及时去掉病叶烂果;现蕾及开花前，喷施质量分数为50%施加乐可湿性粉剂800倍液，或50%速克灵乳油800倍液，或75%百菌清可湿性粉剂600-800倍液等进行防治。