

# 苄乙植物性农药 乙草胺+苄醚磺隆

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 苄乙植物性农药 乙草胺+苄醚磺隆                    |
| 公司名称 | 江苏安邦电化有限公司                          |
| 价格   | .00/个                               |
| 规格参数 | 类别:植物性农药<br>成分:乙草胺+苄醚磺隆<br>剂型:可湿性粉剂 |
| 公司地址 | 淮安市化工路30号                           |
| 联系电话 | 0517-83556161                       |

## 产品详情

|    |                      |        |          |
|----|----------------------|--------|----------|
| 类别 | 植物性农药                | 成分     | 乙草胺+苄醚磺隆 |
| 剂型 | 可湿性粉剂                | 有效成分含量 | 20(%)    |
| 品牌 | 安邦 稻田免除星<br>精克草星 田草亡 |        |          |

产品名称 苄·乙(稻草克星,田草亡,华星草克,田草净)  
有效成分 苄醚磺隆(4.5%)+乙草胺(15.5%)

登记证号 (bensulfuron-methyl+acetochlor)  
Is98370

毒性 低毒  
所属类别 复配水稻田除草剂  
剂型及规格 20%可湿性粉剂

产品特点 y 选择性、内吸传导型水稻移栽田专用除草剂

y 有效成分在水中迅速扩散,被杂草根部和叶片吸收转移到杂草各部,阻碍支链氨基酸的生物合成,阻止细胞分裂和生长,使杂草生长受阻而坏死。

y 适用于水稻移栽田防除一年生或多年生的阔叶杂草和某些一年生禾本科杂草。如稗草、鸭舌草、眼子菜、节节草、莎草、牛筋草、马唐等。

使用技术 作用机理 杂草主要通过根部吸收,药剂进入杂草体内能迅速向各分生组织传导,在顶端抑制细胞分裂及细胞长大,使生长点停止生长,幼嫩叶片不能伸展,作用受到抑制,从而导致杂草死亡。

推荐使用剂量 防除对象:能有效地防除稗草、矮慈菇、异型莎草、水竹叶、千金子、泽牛毛毡、四叶萍、萤蔺、鸭舌草、丁香蓼、眼子菜、水萍草(三棱草)、菜、陌上菜等一年生和部分多年生杂草。

使用方法:1、水稻大苗(秧龄30—60天)移栽田或早稻移栽后5—7天即终

后，每亩用本品30克与20千克湿土细沙或肥料拌后均匀撒施。2、施药时必须要有水层3 - 5cm，使药剂均匀分布。3、施药后7天不排水、串水，以免药效，以后正常管理。

#### 使用注意事项

1、该类混剂仅适用长江流域以及以南水稻大田移栽田，不可擅自增加用量且于水稻缓苗后使用。禁止用于抛秧、秧田、直播田、杂交制种田、漏水田。

2、切忌将施过药的田水排入水生蔬菜田，如荸荠、慈姑、莲藕田等，以免药害。3、清洗器械的水，不能倒入河流或池塘。4、药剂储存于阴凉干燥处。

目标市场  
施用作物

水稻田