

醚磺乙草胺 植物性农药 醚磺隆+乙草胺

产品名称	醚磺乙草胺 植物性农药 醚磺隆+乙草胺
公司名称	江苏安邦电化有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:植物性农药 成分:醚磺隆+乙草胺 剂型:可湿性粉剂
公司地址	淮安市化工路30号
联系电话	0517-83556161

产品详情

类别	植物性农药	成分	醚磺隆+乙草胺
剂型	可湿性粉剂	有效成分含量	25(%)
品牌	安邦 耕夫乐		
产品名称	耕夫乐		
有效成分	醚磺隆(4%)·乙草胺(21%)(acetochlor+cinosulfuron)		
登记证号	Is20001404		
所属类别	复配水稻田除草剂		
剂型及规格	25%可湿性粉剂		
产品特点	1 杀草谱广——能防除移栽稻田几乎所有一年生、多年生杂草。 1 药效优异、持效期长——一次施药,可保持水稻全季基本无草害。 1 安全性高 对水稻及下茬作物安全。		
使用技术	作用机理	醚磺隆为磺酰脲类除草剂。主要通过根部和茎部吸收,由输导组织传送到组织,抑制支链氨基酸的生物合成。用药后杂草停止生长,5~10天后植株黄化,枯萎死亡。乙草胺有效成分在植物体内干扰核酸代谢及蛋白质合成,使幼芽、幼根停止生长。	
	推荐使用剂量	可防除稗草、异型莎草、牛毛草、水莎草、萤蔺、水苋菜、丁香蓼、节节鸭舌草、陌上菜、眼子菜、四叶萍、水花生、鲤肠等大部分禾本科、莎草阔叶类杂草。	
		用药量及使用方法:每亩用本品25~35克,与1公斤左右的湿润细土拌成母土,再与20公斤左右的湿润细土拌匀后撒施,或将母土与肥料拌成药肥撒施。	
		施药适期:水稻移栽后5天,秧苗开始返青,杂草还未出土或刚出土在1-2时,施药效果最佳。	
	使用注意事项	1、秧田、直播田、抛秧田禁止使用。	

2、禁用喷雾和泼浇法施药。

3、撒药前后田间应保持3 - 5厘米的浅水层，水深不得淹没秧苗心叶，药后保水一周，以确保安全、高效。

目标市场
施用作物

水稻移栽田