

草甘膦（镇草宁、农达、Round）

产品名称	草甘膦（镇草宁、农达、Round）
公司名称	江苏安邦电化有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:灭生性除草剂 成分:草甘膦 剂型:水剂
公司地址	淮安市化工路30号
联系电话	0517-83556161

产品详情

类别	灭生性除草剂	成分	草甘膦
剂型	水剂	有效成分含量	41（%）
品牌	安邦		
产品名称	草甘膦（镇草宁、农达、roundup）		
有效成分	草甘膦（glyphosate）		
登记证号	pd20060178，pd20080765		
毒性	低毒未见致畸、致突变、致癌作用。对鱼和水生生物毒性较低；对蜜蜂和鸟类无毒害；对天敌及有益生物较安全。对鱼低毒		
所属类别	灭生性除草剂		
剂型及规格	95%原药，10%水剂		
产品特点	y 良好的内吸传导性，能传导至植物的根部，杀死杂草； y 杀草谱广——可防除单子叶和双子叶、一年生和多年生、草本和灌木等40多科的植物。		
使用技术	作用机理	草甘膦为内吸传导型慢性广谱灭生性除草剂，主要抑制物体内烯醇丙酮基莽草素磷酸合成酶，从而抑制莽草素向苯丙氨酸、酪氨酸及色氨酸的转化，使蛋白质的合成受到干扰导致植物死亡。草甘膦是通过茎叶吸收后传导到植物各部分的，草甘膦入土后很快与铁、铝等金属离子结合而失去活性，对土壤中潜藏的种子和土壤微生物无不良影响。	
	杀草谱及使用计量	1、果园、桑园等除草防除1年生杂草每亩用10%水剂0.5-1公斤，防除多年生杂草每亩用10%水剂1-1.5公斤。对水20-30公斤，对杂草茎叶定向喷雾。 2、农田除草农田倒茬播种前防除田间已生长杂草，用药量可参照果园除草花生长期用药，需采用带罩喷雾定向喷雾。每亩用10%水剂0.5-0.75公斤，对水20-30公斤。 3、休闲地、田边、路边除草于杂草4-6叶期，每亩用10%水剂0.5-1公斤，加	

100毫升，对水20-30公斤，对杂草喷雾。

4、稗、狗尾草、看麦娘、牛筋草、马唐、苍耳、藜、繁缕、猪殃殃等一年草，每亩用10%草甘膦水剂400-700克；

5、对车前草、小飞蓬、鸭跖草、双穗雀稗草，每亩用10%水剂750-1000克；

6、对白茅、芦苇、香附子、水蓼、狗牙根、蛇莓、刺儿菜等，每亩用10% 200-2000克。

7、一般阔叶杂草在萌芽早期或开花期，禾本科在拔节晚期或抽穗早期每亩量兑水20-30公斤喷雾。已割除茎叶的植株应待杂草丙生至有足够的新生叶再施药。防除多年生杂草时一次药量分2次，间隔5天施用能提高防效。

使用注意事项

1、草甘膦为灭生性除草剂，施药时切忌污染作物，以免造成药害。

2、对多年生恶性杂草，如白茅、香附子等，在第一次用药后1个月再施1次才能达到理想防治效果。

3、在药液中加入适量柴油或洗衣粉，可提高药效。

4、在晴天，高温时用药效果好，喷药后4-6小时内遇雨应补喷。

5草甘膦具有酸性，贮存与使用时应尽量用塑料容器。

6、喷药器具要反复清洗干净。