

美香莎草莓苗、美香莎草莓苗品种纯度

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 美香莎草莓苗、美香莎草莓苗品种纯度 |
| 公司名称 | 泰安高新区锦瑞苗木园艺场 |
| 价格 | .40/棵 |
| 规格参数 | 规格:三叶一心 高度:20cm 品种:脱毒草莓苗 |
| 公司地址 | 泰安市南部开发区 |
| 联系电话 | 13468000001 |

产品详情

比对照“红颜”高1个百分点；果皮成色，果肉呈白色，对照“红颜”果皮果肉均为红色；果实。红袖添香北京市农林科学院2006年以‘卡姆罗莎’为母本，以‘红颜’为父本杂交育成。2010年定名为‘红袖添香’。在2012年的第七届草莓大会的精品草莓擂台赛上，勇夺奖项“长城杯”成为草莓擂台赛上颯出的一批。

大棚内北侧挂反光幕，利用反射光增加光照。阴雨天或雪天，可用白炽灯照明补光。草莓苗6.起垄栽培和地膜覆盖起垄栽培可以果实与棚膜滴水，增强阳光对果实的照射，减轻灰霉病发生，促进果实着色。地膜覆盖能地温，降低空气湿度，避免果实直接与土壤，有利于保持果面清洁。草莓苗7.严格控制温度适宜的棚温为开花期白天22~25、夜间8~10，果实期白天20~24、夜间6~10。

方法种苗处理和栽植的选择:草每定植前，除掉的植株，结合其他病害的，可用50%多菌灵可湿性粉剂加50%辛硫磷乳油800倍液浸洗草莓苗，待药液晾干后栽植。或者在栽植草范前，将休眠母株在45-50℃热水中浸泡10分钟，可有效杀灭线虫。加强栽培管理，一旦发现病株.要及时清除.带出温室后集中销毁;深翻改土，可将含病残体的土层深埋，以降低病害的传播基数。

合理在起苗前一天，如果苗子不旺那么可以使用70%硫菌灵可湿性粉剂1000倍液、或70%百菌清可湿性粉剂600倍液、25%多菌灵可湿性粉剂400倍液喷施；可加入4.5%氯菊酯乳油1500倍液、8%中保杀螨2000倍液，综合，根腐病及甜菜夜蛾、红蜘蛛、蚜虫等病虫害。近期，很多草莓苗种植户开始忙着起苗移栽，那起苗移栽都有哪些值得注意的要点呢。

这种方法主要是在草莓匍匐茎比较少的品种或秧苗不足时采用。没有草莓苗又想种草莓，买几斤草莓回家，怎样才能种出草莓来。C种子繁殖。种子繁殖一般情况下很少采用，主要是用种子繁殖比较麻烦，而且繁殖的草莓抗病虫害能力差。但是在特殊情况下也只能采用这种方法了，比如说远距离引种或培养草莓的实生苗来选育新品种等。

开花前开始轻度发病，浆果采收后很多发生，那么如何草莓苗蛇眼病。此病主要为害草莓苗的叶片，多从下部老叶开始发病，逐步向上发展。发病初期在叶片上出现许多大小不等的近圆形小斑，以后中间转变成灰白至灰褐色，有时具有轮纹，湿度高时病斑表面产生白色粉状霉层，即病菌分生孢子梗和分生孢子。后期在病斑上可生出许多小黑点，即病菌子囊座。

美香莎草莓苗、美香莎草莓苗品种纯度整地做畦草莓苗适应土质肥沃、土壤疏松、水源条件好、弱酸性土壤。整地前要进行土壤消、施肥。基肥一般每亩施农家肥（已腐熟的）1500-2500公斤、磷肥75公斤、尿素15公斤。畦面宽100-150厘米。畦埂宽25厘米、高10厘米。草莓苗良种壮苗目前较为理想的有：全明星、丰香、巨早、春香、五月香、明宝等。

大棚种植草莓要施足基肥，耕种帮种植网建议每亩施纯氮11.3千克、磷18千克、钾13.5千克，才能保证每亩草莓产量达到2000~3000千克。一般每亩施用腐熟的农家肥5000~6000千克或腐熟鸡粪3000~5000千克，也可用饼肥200~250千克代替。草莓生长主要依靠农家肥，基肥一定要施足，这对高产型栽培尤其重要。