

红颜草莓苗、红颜草莓苗老商家

产品名称	红颜草莓苗、红颜草莓苗老商家
公司名称	泰安高新区锦瑞苗木园艺场
价格	.40/棵
规格参数	规格:三叶一心 高度:20cm 品种:脱毒草莓苗
公司地址	泰安市南部开发区
联系电话	13468000001

产品详情

红颜草莓苗、红颜草莓苗老商家草莓还含有丰富的维生素B1、B2、C、PP以及钙、磷、铁、锌、铬等必需的矿物质和部分微量元素。草莓中所含的胡萝卜素是合成维生素A的重要物质，具有明目养肝作用。中认为，草莓性凉味酸，具有润肺生津、清热凉血、健脾解酒等，下列验方可供参考：1.遇积食腹胀、胃口不佳时，可在饭前吃草60克，每日3次；

高抗灰霉病和病，对其他病害抗性也很强，很少害发生，适应性广，休眠期在45小时左右较短。浆果圆锥形，大小整齐，畸形果少，表面深红色有光泽，种子，果，香味浓，甜味大，糖度为12.8%，可溶性固形物11.9%，硬度大、耐贮运。草莓苗基地;供应公主草莓苗2、红颜（、99、红脸颊）：植株较高(25厘米)，结果株径大，分生新茎能力中等，叶片大而厚，叶柄浅绿色，基部叶鞘略呈红色，匍匐茎粗，抽生能力中等，花序梗粗，分枝处着生一大一小两叶。

红颜草莓苗、红颜草莓苗老商家雌虫产卵后死亡，卵在土壤中孵化成幼虫，进行再侵染，条件适宜时25~30天可发生1代，1年可发生数代。根结线虫在通气良好、质地疏松的沙壤土中发生重，尤其是肥力低的沙质丘陵薄地发生重，黏性土壤发病轻；连作地发生重，轮作地发病轻，水旱轮作可以有效控制病害的发生。土壤含水量占田间大持水量的20%以下或90%以上都不利于根结线虫的侵入。

耕翻耙细，整成宽1m、高10-15cm、沟宽25-30cm的高畦。2.品种及母株的选择与定植：选用休眠浅、低温下开花多、自花授粉能力强、抗病的品种，如、莎、章姬等。母株选择品种纯正、生长健壮、根系发达，无病虫害的大苗，开春后定植，每畦1行，株距40-60cm。抽生匍匐茎能力强的株距可大些，反之则小些。

由于休眠浅，夏季繁苗期出现开花结果现象，应及时摘除。该品种生长健壮，多级花序，结果期长，产量高，生产果实一般亩栽6千至7千棵，产果3500至4500斤。草莓新品种红颜草莓苗提供优质红颜草莓苗

红颜草莓的缺点是不抗病，育苗不易，很容易患病，采用脱一代苗作种，生产二代苗结果，一般亩栽800至1200棵，可繁殖4万至5万优质壮苗，可供5亩地生产用苗。

红颜草莓苗、红颜草莓苗老商家在繁殖圃内，育苗期缺水，会阻碍茎叶的生长，匍匐茎苗不易生根，降低出苗的数量及质量。在草莓果实生长发育期要求水分供应充足，开花期土壤含水量应不低于大田间持水量的70%，果实膨大及成熟期，土壤含水量应不低于80%，否则，坐果率低，果个小，品质差。秋季9~10月份，正是草莓植株积累养分，进行花芽分化的时期，要求水分较少，土壤含水量达土壤持水量的60%时即可，水分过多，花芽形成的数量少，质量差。

在幼苗长出2片真叶时，进行分盆，4~5个叶片时，即可换大盆。苗期管理浇水幼苗期不适于漫灌，可用喷灌的办法满足供水。苗长到6片真叶后，可采用小水漫灌，防上淤苗。追肥小苗长到6片真叶时，可进行次追肥，以追施尿素为宜。可把尿素溶于水中制成稀肥喷施。次追肥，用量宜少。以后每20~30天追一次肥，随苗株的长大，用肥量可适当增加。