

达赛莱克特草莓苗、达赛莱克特草莓苗培育技巧

产品名称	达赛莱克特草莓苗、达赛莱克特草莓苗培育技巧
公司名称	泰安高新区锦瑞苗木园艺场
价格	.40/棵
规格参数	品种:脱毒草莓苗 高度:20cm 规格:三叶一草莓苗
公司地址	泰安市南部开发区
联系电话	13468000001

产品详情

或使用50%速克灵可湿性粉剂800倍液、2.5%适乐时（咯菌）悬浮剂1500倍液，进行叶面喷雾。 、病：可以使用24%嘧菌已唑醇悬浮剂3000倍液、或50%醚菌酯水分散粒剂3000倍液、10%苯醚甲环唑水分散粒剂2000倍液，要叶背和叶面均匀喷施。可以使用70%丙森锌可湿性粉剂500倍液，80%代森锰锌可湿性粉剂700倍液，60%吡唑代森联水分散粒剂1200倍液，或50%咪鲜胺可湿性粉剂1500倍液，25%吡唑醚菌酯乳油1500倍液，或75%百菌清可湿性粉剂800倍液，进行叶面均匀喷施。

抗病能力较强。丰产性好，晶瑶草莓果型大，果重100克，一级序果平均重45克，连续结果性强，结果期长，挂果采收期从12月开始可以延长至第二年5月份;大棚促成栽培，亩产达2000千克左右。风味佳，口感香甜、色泽鲜艳、商品性好，可溶性固形物含量平均达12.8%，糖酸比11.2，果实表面和内部色泽均呈鲜红色，着色一致。

佐贺清香草莓苗植株长势及叶片形态与丰香相似，植株长势强，但略比丰香直立，新茎分枝稍少，花序上花朵数稍少。株高20~25cm，叶片大，叶色浓绿。匍匐茎苗40~60株。花梗。花芽分化期和开花期均比丰香早5~7天，休眠期极短，冬季温室栽培矮化程度轻。抗草莓病能力明显强于丰香，抗草莓、草莓病能力与丰香相当，抗矮化能力优于丰香。

品种特点：紫金久红草莓品种果实圆锥形或楔形，平均单果重17.3克，果面红色，平整，光泽强。果基无果颈无种子带，种子分布稀且均匀。风味甜，香味浓郁。平均可溶性固形物含量11.3%，硬度高，耐贮运，平均硬度为2.04

公斤/厘米²。座果率高，畸形果少。株态适中，半直立。叶片绿色，叶面粗糙，厚，椭圆形，叶片长7.

2周后揭膜，可有效杀灭土壤中的病虫害。揭膜后翻耕透气5~7天，就可以定植了。实践证明，日晒与棉隆相结合方法对土壤线虫、地下害虫及杂草种子等均具有非常高的灭杀效果。

温度管理：，防高温；10月中下旬扣棚后3-4天，白天保持30℃，夜间保持5-10℃，5-6天后28℃，7、8天后25℃，目的打破休眠，促进花芽分化；11月下旬至12月初，应在大棚内加设小拱棚覆盖，根据气温变化情况增减草帘薄膜覆盖的层次。江苏地区适宜的扣棚时间在9月15-20左右。第二道棚11月中下-12月初盖。

达赛莱克特草莓苗、达赛莱克特草莓苗培育技巧别看都叫白草莓，目前国内市面上已经有至少7个品种在白草莓，还有些品种仍在培育阶段。各品种白草莓，在外形、水份、酸甜度等都有差异。不同偏好的朋友们可以对选草莓。口味偏酸，选“桃熏”作为白草莓当中“粉”的，桃熏的得名也和它的外表有关。桃熏倒过来放，像是活脱脱水蜜桃的样子。它的味道层次也比较丰富。

当匍匐茎抽生幼叶时，前端用少量细土压向地面，使生长点外露，促进发根。进入8月份以后，匍匐茎苗布满床面时及时去掉多余的匍匐茎，一般每棵母株保留70-80个匍匐茎苗。栽培季节三、科学定植1.整地施基肥：草莓施肥以基肥40%，追肥60%为佳。栽植前2-3周整地，每666.7m²施腐熟土杂肥2000-3000kg，鸡粪需1-2月前施用，复合肥40-50kg，磷肥50kg，其中50%在畦面开沟时施入，50%整地时施入。