

山东地区福晨樱桃樱桃苗品种纯正

产品名称	山东地区福晨樱桃樱桃苗品种纯正
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

“福星”早果性强，苗木定植第二年开花株率达82%枇杷的花期在冬季，而冬季有时雨雪低温天气较多的季节，如果不注意防寒措施，那么就会使得花器和树体受到冻害，从而影响到坐果率，所以除了在施足基肥的基础上，还要做好防寒抗冻措施。可以在低温来临前在果园内灌水，这样能提高抗寒力，还可以覆盖地膜，第三年开花株率%。幼树腋花芽结果例高。成年树一年生枝条甩放后，易形成大量的短果枝和花束状果枝。自然结实率为7.2%，生产栽培中需配置授粉树。

福晨樱桃品种适宜栽植密度，平地一般为3米×4~5米，可以在春季气温刚回升时，这时枝条的抗压能力较强，可以对于营养枝进行短截，促进春梢萌动，一般能让花蕾整齐的在春梢抽出。同时在开花期间及时喷洒2-3次含锌、硼、镁等元素的叶面肥，这样能促进花蕾的形成，还能为新梢生长和开花提供充足的营养。另外还可以按照叶片的褪色情况，及时向树冠喷水叶面肥，以快速的满足植株鹅养分需求。丘陵地一般为2~3米×3.5~4.5米；采用自由纺锤形树形；选用早生凡、桑提娜等为授粉品种；花果及肥水管理、病虫害防治等与一般早熟品种相同。

形态分化期一般1~2个月即可完成，但花器的发育要一直延续到第二年春天，起到保温保湿的作用。也可以在11月对树干进行涂白，缩小夜温差，避免树皮冻裂，可增强抗寒力，在发生霜冻时可以采用熏烟的方法防止，在冻害前可以喷施植物细胞分裂素和果实防冻剂提高花果的防冻能力。直至花粉形成才算后完成。樱桃花芽分化期可划分花原基形成期、花萼原基分化期、雄蕊原基形成期和雌蕊原基分化期等五个阶段。