

圣诞红草莓苗、 圣诞红草莓苗几年结果

产品名称	圣诞红草莓苗、 圣诞红草莓苗几年结果
公司名称	泰安高新区锦瑞苗木园艺场
价格	.40/棵
规格参数	品种:脱毒草莓苗 高度:20cm 规格:三叶一草莓苗
公司地址	泰安市南部开发区
联系电话	13468000001

产品详情

方法种苗处理和栽植的选择:草每定植前，除掉的植株，结合其他病害的，可用50%多菌灵可湿性粉剂加50%辛硫磷乳油800倍液浸洗草莓苗，待药液晾干后栽植。或者在栽植草范前，将休眠母株在45-50℃热水中浸泡10分钟，可有效杀灭线虫。加强栽培管理，一旦发现病株.要及时清除.带出沮室后集中销毁;深翻改土，可将含病残体的土层深埋，以降低病害的传播基数。

草莓苗厂家教大家如何清洗草莓：一般大家买了草莓回去，放在水里泡泡，然后拿掉草莓上面的叶子，洗干净，就开始吃了，这是很多人的做法，其实这样有着很多的安全隐患的，草莓上还有着许多的残留，不洗干净回去吃了很危险的。草莓苗厂家提醒大家，洗草莓之前一定不要去掉草莓蒂，以免洗草莓过程中，残留渗进去。1、将草莓放入果盆中，不间断地用自来水冲洗草莓，这样可以冲掉附着在草莓表面的脏东西和。

选苗时尽量用母本圃而不用生产圃苗，以离母株近、叶片多、根系好、生长旺的1-3株苗。还应注重选用早中晚熟品种的搭配和授粉品种的搭配。适时移栽一般在9月上中旬进行移栽。四、精心起运移栽选在阴雨天，随起随运随栽。起运之前，要控制肥水，适时晾苗。若需外运，装前应摘去部分衰老叶或留下7-10厘米长的叶柄，每50-100株一捆，用清水洗净，装进用水浸过的蒲包中，不能压得太紧。

草莓还含有丰富的维生素B1、B2、C、PP以及钙、磷、铁、、锌、铬等必需的矿物质和部分微量元素。草莓中所含的胡萝卜素是合成维生素A的重要物质，具有明目养肝作用。中认为，草莓性凉味酸，，具有润肺生津、清热凉血、健脾解酒等，下列验方可供参考：1.遇积食腹胀、胃口不佳时，可在饭前吃草60克，每日3次；

要注意药剂的轮用，不要连续使用同一个品种药剂2次以上。草莓苗移栽后死苗问题是很多果农朋友头疼的问题，下面就告诉大家如何降低草莓苗的死苗率：一、先给大家简单介绍一下草莓苗的死苗原因1、移栽大田严重缺乏肥，导致叶片叶柄呈黑褐色灼。移植后如何降低草莓苗的死苗率。

草莓对水分反应非常敏感，喜潮湿但又怕涝。草莓的根系分布较浅，加上植株矮小，而叶片则较大，因此蒸发量大。在整个生长季，叶片几乎都在不断地进行老叶死亡，新叶发生的过程，叶片更新频繁。草莓在采收后植株抽生大量的匍匐茎和新茎。这些特点，决定了草莓对水分要求较高。草莓在不同的生长发育时期，对水分的要求不同。

圣诞红草莓苗、圣诞红草莓苗几年结果促成栽培，促成栽培是在草莓进入休眠前开始保温，不让植株进入休眠，在冬季也正常生长发育，使草莓提早开花结果的栽培技术。草莓果实始熟期一般在11月下旬或12月上中旬。促成栽培所用保护地设施因地区而异，在我国北方地区，宜采用高效节能日光温室，而在长江流域及以南地区宜采用塑料大棚。促成栽培所用品种选择原则上以浅休眠品种为宜，但休眠程度稍深的品种可采用赤霉素和补光处理来避免休眠，也可进行促成栽培。

果肉白色，质地与章姬相当，可溶性固形物12%以上，甜酸适口，风味，香气浓。贮运性能中等。9月上旬定植。亩栽7000株，丰产性能好，对肥水要求高，亩产量3000千克以上。抗草莓病、灰霉病。8、丹莓1：辽宁草莓科学2015年育成的中早熟品种，‘甜查理’做母本、‘红颜’做父本，有性杂交育成（代：R7×99-3）。