

## 对节白腊（景树） 桩景类/树木类

产品名称	对节白腊（景树） 桩景类/树木类
公司名称	武汉欣荣博发园艺有限公司
价格	1000.00/棵
规格参数	类型:桩景类/树木类 产地:武汉市江夏区安山镇 品牌:对节白腊（景树）
公司地址	中国 湖北 武汉市 洪山区雄楚大街209号1号楼1203
联系电话	86 027 87105671 15207194060

## 产品详情

类型	桩景类/树木类	产地	武汉市江夏区安山镇
品牌	对节白腊（景树）		

以“活化石”著称对节白蜡作为首选观赏性珍稀植物，是当今世界仅存的木犀白蜡，属稀有名贵树种，俗称“对节树”、“思亲树”，是世界景点、盆景、根雕家族中的极品，被誉为“楚天第一节”和“盆景之王”，为国家二级保护植物。1999年昆明世界园艺博览会上，被评为植物类金奖。在全球范围内，仅湖北山特产。对节白蜡小百科 植物名称：对节白蜡 拉丁文名：fraxinus hupehensis chu shang et su. 科属：木犀科 oleaceae 白蜡属。形态特征：落叶乔木，高可达19米，径1.5米，树皮深灰色，老时纵裂，枝近无毛，侧生小枝常呈棘刺状，奇数羽状复叶对生，长达7-15厘米，小叶7-9枚（可达11枚），小叶柄很短，被毛，叶轴与叶柄交叉处有短柔毛，叶片披针形至卵状披针形，长1.7-5厘米，宽0.6-1.8厘米，先端渐尖，缘具细锐锯齿，齿端微内曲，叶表无毛，侧脉4-6对，背面稍显。花簇生，花两性，有苞片和花萼，但无花冠，雄蕊2枚，花丝细长，5.5-6.0毫米，柱头棒状，花药长1.5-2.0毫米，先端2裂，翅果，倒披针形，长4-5厘米，先端尖，花萼宿存，浅皿状，花期3月，果熟9月。

一、对节白蜡的植物学特征 对节白蜡为木犀科，白蜡属植物。原产湖北的钟祥、京山，为落叶乔木，高达30余米。幼、壮龄树皮光滑，浅灰绿色，中、老龄树皮有纵向深灰色皴纹。树枝萌发力强，耐修剪。树体耐旱、耐湿、耐高温，喜肥、喜水、喜阳光，北京地区以南均可露地栽培。适宜中性和弱酸性土壤，pH值5—7。靠播种和扦插繁殖。

二、对节白蜡山桩的处理和扦插繁殖 远离产地购得的对节白蜡树桩，均为山民在冬季和早春采挖。本地培植采挖时间除6月中旬至8月中旬外，均可采挖。山民在采挖、运输途中一般保护措施较差，虽然此种树有很强的生命力，为求得较高的成活率，仍需对其不同程度的脱水现象加以重视。首先，截栏要一次到位。该树种生根容易，根径200mm的锯口仍能发须根，因而凡妨碍将来上盆、造型的根、枝要果断锯去。其次要吸足水分，有条件的最好将根部直立放在溶有生根剂（如生根粉、维生素b12）的水中浸泡处理，处理时间以生根剂使用说明书为准。或整桩都泡在清水中一昼夜，然后植于砂床中养护。埋根深度在20cm以上，干径大于20cm的老桩、剖干桩应适当加深。排桩距离：中型桩间距应大于0.5m，大型桩应大于1m。如此有利于枝条伸展，否则枝条相互遮掩，不利于生长和剪枝整型时操作。再次，植后应满灌水，使砂与树根缝隙密实接触，平时保持砂床湿润，对树干经常洒水。若用30%-50%遮阳网保护，效果会更好。一般情况下，至晚春初夏便会发芽。8月上旬立秋后可拆去遮阳网，使其尽享阳光。在4月末至5

月初，如仍有未发芽之树桩，用小刀刮其树皮如顶部皮仍为翠绿色，而不是枯黄色，即可从砂床中拔出，用清水浸泡一昼夜后砂植于半阴半阳处养护，尚能促进发芽成活。为保护生态环境，现提倡播种和扦插繁殖。播种适于大面积繁殖。可参考园林技术资料行之。盆景爱好者用扦插繁殖更简便易行，于冬季和春季进行。用一年生健壮枝条，于发芽前剪10cm~15cm长，插入砂床中，适当遮阴，经常浇水保持砂床湿润。30多天即可生根，5月中旬即可移栽到大田培育。也可夏插和秋插，但必须遮阴，保持砂床湿润，管理难度稍大。

三、对节白蜡树桩的定枝整形 第一年萌发的新芽，要视各树桩发芽长枝的旺弱来处理。对于旺树，一般到八月上旬立秋以后，大多数枝条长至40cm以上时，进行定枝，留下符合造型方向的枝，丛生枝留1-2枝，余则去除。如发现需要来枝的部位没有来枝，可用树干下部多余枝往缺枝部位靠接。下部造型枝要用绳或铝丝牵拉到位，此时最好不用缠绕法扎缚造型。因对节白蜡枝增粗较快，稍不注意，就会陷丝，影响一级枝条的美观和生长。定枝后每隔一星期按植株面积，每平方米10g-20g施尿素肥一次，促其新生枝增粗。因对节白蜡在日平均气温15摄氏度以上时均可生长，新桩只要水、肥和阳光充足，当年至霜冻前旺枝基部直径可达20mm以上。因此对于顶生枝应先对其掐尖控长，（快速成型的商品桩则可剪定一级枝，年底剪定二级枝）。底部和其它部位需增粗的枝，则放任生长。管理过程中要随时观察，发现干身出枝基部萌发多余枝应及时抹除，否则疯枝会突长，白白消耗养分，影响定型枝生长增粗。霜冻落叶后，即可上盆。从砂床中挖出桩材，抖掉根上砂砾，剪去过长根须，剪定枝形。根据桩形大小配植，填上营养土，浅盆应打上围子，不使须根露出盆土面。最后浇足水分，加强越冬管理。如砂床不急于利用，可于冬季剪枝，春季发芽前夕上盆则更好。对于弱枝，虽发芽抽枝，而根未长出或长得稀少，应继续植于砂床中培植，待第二年根、枝长旺后再上盆。切忌急于剪枝上盆，影响成活率。

四、对节白蜡枝片的造型 对节白蜡是生长旺盛的速生树种，经一年基干枝的培育剪定后，除少数特意留长增粗的顶生过渡枝、飘枝、俯枝外，大多数枝第二年即可剪枝蓄片了。初期一、二级枝以扎（拉）为主，以剪为辅，后期枝片基本成型后以剪为主，以拉为辅，一般采取先上后下，抑强扶弱的剪枝手法来修剪。先上后下：即树体上部枝先剪，过一段时间再剪中部枝，再隔若干天剪下部枝。同一枝片，上扬枝先剪，待平行枝长到比上部枝要粗时再剪。抑强扶弱：同在上部的强旺枝要先剪若干天，等弱枝长到一定粗度时再剪。目的使枝的粗细与它所处的位置相配。对于长势特别旺的树材，除平时注意控制外，可进行摘叶剪定枝片。到秋季霜降后，树时经霜凋谢，枝形裸露，对观察枝（片）的走势走向，前后穿插、高低错落、位置形态十分有利，这时可对枝形来一次精心的修剪扎缚。能剪到位的用剪来完成，剪不到位的，可用铝丝缠绕弯曲牵位到位；有的枝片过于上扬或方向、位置欠佳，用铝丝或绳索牵拉到位。对节白蜡应特别注意它的对生枝和蛙腿枝：干上定枝和一、二级枝上要错开剪去对生枝；蛙腿枝可一边蓄长，一边剪短或改成掉拐枝。

五、对节白蜡盆景的肥水管理及病虫害防治 对节白蜡盆景的管理养护工作，可以用“大水、大肥、大太阳”来概括。大水：即须有充足的水分，偏湿比干好；大肥：生长季节薄肥勤施，为便于树体吸收、避免肥液浪费，宜5-7天施一次。施肥时间一般于晴天下午盆土偏干时进行，施后浇水冲叶。阴雨天盆土湿时树根呼吸不畅，施肥后树根不易吸收；大太阳：即便是三伏酷热天，只要水分跟上38℃-40℃的高温强阳光，亦见其抽芽生长，枝尖很少有自剪现象，可见其适应性特别强，判断它缺不缺水、肥和阳光，最简单的办法是观察其新梢发芽情况：肥、水和阳光充足时，树梢发出的枝粗壮，嫩枝、叶呈紫红色，渐转绿色；不足时，发出的枝细弱，嫩叶淡绿色。摘叶剪定枝芽前5~7天，必须施一次饼肥水，在生长旺季，强剪后三天即见新芽萌出。新芽萌出后，应再补施一次饼肥水，水肥比例为8:1，枝片愈趋于丰满，剪枝次数也可适当增加。对节白蜡除土壤偏碱性和长期喷灌自来水，叶片出现黄化病以外，目前尚未见其它病菌侵入危害。黄化病宜用硫酸亚铁按1:400兑水溶化后灌根，每隔一星期灌一次，连续3~5次即愈。侵害对节白蜡的害虫，开始几年未见发生，近年来发现主要有两种：一种为花蓟马，幼虫体长1.5mm左右，常于春季危害已展开的新叶，使叶片边沿外卷，使新发芽尖缩为一团，伸展不开，心叶渐渐枯萎。应及时用敌杀死800~1500倍液、或敌敌畏80%乳油1000~1500倍液、或潜虫杀1000~2000倍液喷雾灭杀；或天幼虫危害期过后，摘除翻卷病叶及正常时，促发新叶，即恢复正常。另一种为吹绵蚧、红蜡蚧。对阳光不足树势不旺的树，多在枝条上危害，刺吸树汁。可于5~6月、9~11月幼虫孵化盛期，用20%杀灭菊酯2000倍液喷雾灭杀，最好在害虫刚发生时用人工除虫。

成形对节白蜡景树，每株价格都不相同，价格面议，量大优惠，不支持网拍！