

# 吉早红草莓苗特性简介 脱毒二代吉早红草莓苗

产品名称	吉早红草莓苗特性简介 脱毒二代吉早红草莓苗
公司名称	泰安开发区至盛园艺场
价格	.70/棵
规格参数	至盛园艺场:1 齐全:1-6 山东:泰安
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村（经营场所）
联系电话	13455732678

## 产品详情

草莓苗 吉早红草莓苗2020年山东至盛园艺场育苗10万棵

我社拥有500多亩草莓育苗基地，分片管理，欢迎各地新老客户前来考察订购草莓苗，我社拥有500多亩草莓育苗基地，分片管理，欢迎各地新老客户前来考察订购草莓苗，主要品种有红颜（又称为红颊、红霞、99），黔莓草莓苗 隋珠草莓苗 香野 京藏香 红玉 政源2号 蒙特瑞 丹莓2号 章姬（又称为甜宝、牛奶草莓），隋珠 久香 华艳 艳丽 妙香 香野 白雪公主 丰香，甜查理，法兰地等，此类草莓苗根茎粗壮，根系发达，植株低矮，成活率极高，花芽分化早，产量高，深受客户好评。

**防治策略：**在高温高湿天气来临之前或其间，要少施或不施氮肥，保持一定量的磷、钾肥，避免串灌和漫灌，特别要避免傍晚灌水。在草坪出现枯斑时，应在早晨尽早去掉吐水(或露水)，有助于减轻病情。夏季剪草不要过低(一般在5-6厘米)，过密草坪要适当打孔、梳草，枯草和修剪后的残草要及时清除，应种植抗(耐)病品种，要进行及时有效的化学防治。防治褐斑病可以选用甲托、三唑酮等常规杀菌剂，如果病情很严重的话，可以选用阿米西达或56%嘧菌酯百菌清。对严重发病地块或发病中心，用高浓度、大剂量上述药剂灌根或泼浇控制。

**白粉病：**主要为害叶片，也侵害花、果、果梗和叶柄。叶片上卷呈汤匙状。花蕾、花瓣受害呈紫红色，不能开花或开完全花，果实不膨大，呈瘦长形；幼果失去光泽、硬化。近熟期草莓受到为害会失去商品价值。

**防治对策：**在发病中心株及其周围，重点喷布波美0.3度石硫合剂。常用的药剂还有苯醚甲环唑、三唑酮、腈菌唑、氟硅唑等。药剂应交替使用。保护地栽培的，也可采用硫磺熏蒸技术，在温室内每百平方米安装1台熏蒸器，熏蒸器内盛20克硫磺粉，在傍晚盖苫后开始加热熏蒸，隔日1次，每次4小时。但熏蒸器

温度不可超过28℃，以免亚硫酸对草莓产生药害。温室内夜间温度超过20℃时要酌减药量。

防治对策：及时摘除老叶，清理田间，消灭杂草。

- 1、在设施内放养七星瓢虫、食蚜蝇、草蛉等红蜘蛛的天敌，防治效果较好。
- 2、在繁苗期，应加强喷药防治，减少蚜虫的病毒病传播机率。
- 3、草莓开花期前喷药防治1-2次，50%的敌敌畏溶液1000。50%抗蚜威2000倍，10%吡虫啉1500倍等。各种药剂应交替使用，避免单一用药，以免产生抗药性。注意花期不能用药，以免造成果实畸形。采果前2周停止用药。打药时注意药雾要细，多喷在叶背和叶心上，采用淋洗式喷布。此外也可配合物理防治和生物防治等。同时加强田间管理，及时摘除老叶，清理田间枯叶和杂草。