

# 长春花基地 合胜花卉苗木 长春花

产品名称	长春花基地 合胜花卉苗木 长春花
公司名称	青州市合胜花卉苗木专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼恒大花卉苗木基地
联系电话	13583693933

## 产品详情

### 长春花黄化病

发病症状：受病植株叶片黄化。

病原：植原体。其形态有球状、椭圆状以及不规则形等。这种多形菌体一般大小直径为80~800nm。

防治方法：

拔除病株。

选择健康植株作繁殖母株。

防治传播介体叶蝉，长春花基地，减少田间传播。常用的药剂有50%辛硫磷800倍液，或50%敌d i畏1000倍液等。

用四环素对病株进行z h i疗。

长春花多为播种育苗，也可扦插育苗，但扦插繁殖的苗木生长势不如播种实生苗强健。 [5] 1、播种育苗  
采种时间：长春花果实因开花时间不同而成熟期也不一致，长春花，因此种子要随熟随采。果实成熟、颜色转黑后皮易裂开使种子散失，天天开，故需及时采种。当看到果皮发黄，并能隐约映出里面黑色的种子时，长春花小苗，就要采收。 [5] 播种时间：种子发芽适宜温度为20~25℃，通常在3~5月播种繁殖，多作一年生栽培。为提早开花，可在早春温室播种育苗，给以20℃环境，春暖移至露地培育

温度控制长春花对低温比较敏感，所以温度的控制很重要。在长江流域冬季一定要采用保护地栽培，低于15℃以后停止生长，低于5℃会受冻害。由于长春花比较耐高温，所以在长江流域及华南地区经常在夏季和国庆节等高温季节应用。

水肥管理长春花雨淋后植株易腐烂，降雨多的地方需大棚种植，介质需排水良好对于完全用人工栽培的，则施肥宜采用20-10-20和14-0-14的水溶性肥料，以200~250ppm的浓度7~10天交替施用一次。在冬季气温较低时，要减少20-10-20肥的使用量。如果是用普通土壤为介质的，则可以用复合肥在介质装盆前适量混合作基肥。当肥力不足时，再追施水溶性肥料。

长春花基地-合胜花卉苗木(在线咨询)-长春花由青州市合胜花卉苗木专业合作社提供。青州市合胜花卉苗木专业合作社（[www.heshenghh.com](http://www.heshenghh.com)）在花木这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合胜花卉苗木一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈立国。