

明晶草莓苗、明晶草莓苗亩产收益

产品名称	明晶草莓苗、明晶草莓苗亩产收益
公司名称	泰安高新区锦瑞苗木园艺场
价格	.40/棵
规格参数	品种:脱毒草莓苗 高度:20cm 规格:三叶一草莓苗
公司地址	泰安市南部开发区
联系电话	13468000001

产品详情

学习的地点：山东锦瑞苗木合作社，学习的时间：一般是周六、周日，学习两天，周五晚上报到。描述：草莓新品种红颜草莓苗提供优质红颜草莓苗红颜草莓简介红颜草莓（又称草莓，99，红霞），是目前品质的草莓，2011年元旦上海草莓批发红颜果实15元一市斤。红颜草莓生长势强，植株较高（25厘米），结果株径大，分生新茎能力中等，叶片大而厚，叶柄浅绿色，基部叶鞘略呈红色，匍匐茎粗，抽生能力中等，花序梗粗，分枝处着生一大一小两叶。

方法/步骤6:尝尝草莓的味道：好的草莓甜度高且甜味分布均匀。草莓吃起来寡淡无味、闻着不香。方法/步骤7:称草莓的体重：体重大的草莓不要买，那样的草莓不能买，多为草莓。而体重适中，比较轻的草莓会比体重大的草莓好。浙江草莓苗开花时应控制浇水：在草莓苗开花时应控制浇水浙江草莓苗什么时间浇水，这个是需要果农控制好的，这个要定期进行浇水，浇水的量多少都要控制好，否则就会影响草莓苗的生长，就会影响果实的收成，影响了我们的产量，也会导致咱们的经济损失较重。

根腐病：主要为害苗子根系并造成腐烂，为害严重时，会发现老叶边缘或全叶变为红、橙或赤褐色，有时候嫩叶会变为淡蓝色，在严重时发现苗子矮化，茎部变成褐色然后腐烂，后整株苗子。主要的虫害：1、蚜虫：对草莓危害的蚜虫主要是桃蚜和棉蚜。刚开始是成虫、若虫群集在叶片背面和嫩叶、叶柄处，吸食汁液造成叶片卷缩变形，会影响叶片的光合作用。

草莓苗定植后，一个半月左右，还可以再进行一次化学防草。这样，到六月份前是不用人工除草的。到六月后，草莓苗大量出来后，只能人工除草了。除草要及时，不要严惩影响草莓生长才去做这个工作，一定要勤。整理植株草莓长出匍匐茎，要及时将它引到垄空地，要有规律地摆放，严防长到沟里去。还有，要经常摘去老叶子，一棵苗子有三四片叶就可以了，没必要留多。

无论秋季还是春季购买草莓苗，尽量不要购买假植苗，应从苗圃地直接起苗购买。或在市场上选购刚出圃上市的草莓苗。5、注意检查有无病虫害。要选择有检疫证明、无病虫害的草莓苗。6、注意检查苗木

是否受冻。苗木越冬假植不当，易受冻害，剪断枝条，断面变为褐色。说明受冻，这样的苗木成活率低不宜购买。注意检查根系是否霉烂。

具体的扣棚时间主要受以下三个因素的影响：因不同品种休眠时期的早晚不同，对低温的需求量也不同，解除休眠时期的早晚也不同，因此，不同品种开始扣棚保温的时期也就不同。休眠浅的品种可以早扣棚；相反，休眠深的品种，低温需求量高，扣棚保温的时期也就晚；保护设施的保温性能。保温性能好的日光温室可以提早保温，只要低温需求量已满足休眠的要求即可保温；

明晶草莓苗、明晶草莓苗亩产收益为种子发芽率，播种前可将种子包在纱布内，24小时，在冰箱中经过0~3℃低温处理约15天，以打破种子的休眠，然后播种。肥水管理：四季草莓1年多次开花结果，营养消耗多，要加强养分补充。可用兽蹄、鱼骨、家禽内脏、豆饼等，加水腐熟发酵，沤制成液态肥水或追施复合肥。一般每星期追肥一次。每天早晚各浇水1次。

低温季节和阴雪天室内空气湿度大，放风又会使室内温度降低，这时只能在中午短时间放风。草莓不同生育期对空气相对湿度的要求不同：现蕾期为60%~80%，开花期为30%~50%。如花期湿度过高，花粉传播会受到很大影响，降低坐果率和产量。在草莓果实成熟期的室内空气相对湿度控制在60%~70%较为适宜。