

早光草莓苗、早光草莓苗基地

产品名称	早光草莓苗、早光草莓苗基地
公司名称	泰安高新区锦瑞苗木园艺场
价格	.40/棵
规格参数	品种:脱毒草莓苗 高度:20cm 规格:三叶一草莓苗
公司地址	泰安市南部开发区
联系电话	13468000001

产品详情

也可用10%吡虫林可湿性粉剂1500~2000倍液、10%氟啶虫酰胺水分散粒剂1000~1500倍液进行叶面喷施。、红蜘蛛：可以使用73%克螨特乳油1000倍液、0.6%齐螨素（阿维菌素）乳油3000~5000倍液，25%灭螨猛可湿性粉剂1000~1500倍，还可以用0.5%阿维菌素乳油1500倍液，或1.

在破膜时把正对草莓植株的地膜划1个小孔，在保证能把草莓植株拉出膜外的情况下，孔越小越好。把草莓植株拉出膜外后，植株基部再用土压实，可以减少土壤水分的蒸发，同时也可以降低棚室内的空气湿度。在破膜提苗时，应注意保护草莓植株，尽可能减少草莓植株的伤害。同时要将大小植株全部提出，以防丢落。

为了便于管理，一般在草莓苗进入休眠，土壤尚未封冻这段时间进行，即11月下旬至12月上旬。农民操作时大部分按大雪节气之前扣棚。2月中下旬扣棚也可以，但由于此期尚未解冻，操作起来有一定难度。如果早扣棚，扣完棚后扣地膜；如果晚扣棚必须先扣地膜，要求在土壤封冻前完成。过早扣棚，需冷量高的品种易出现不出蕾，影响产量。

那些太大的和过于水灵的草莓不要买，长得奇形怪状的畸形草莓也不要买。挑选草莓时，从颜色上看，应该尽量挑选全果鲜红均匀、色泽鲜亮、有光泽的草莓。有时候我们发现有一些是感染病虫害的草莓，食用这样的草莓会对有一定的危害。主要的病害：1、病：在叶片发病初期，叶片背面有薄薄的白色菌丝，叶片表面会出现暗色污斑，慢慢病斑逐步扩大，在叶背面形成一层白色粉状物，严重时多个病斑连接成片，后期病斑变红褐色，导致叶片、焦枯。

定苗一般播种后3~4天即可出苗，出苗后清除秧苗上方的稻草，子叶展开，真叶开始显现时删苗，每穴留苗2~3株；发现红心草莓苗有缺株，应在阴天或晴天傍晚补苗，并浇水保苗。育苗移栽的，在子叶展开即可定植，边定植边浇水，畦面盖稻草，。田间管理夏秋季雨水较多，土壤易板结，杂草生长快，在出苗后或浇缓苗水后封垄前应分次松土除草，结合中耕每7~10天培土一次。

幼虫侵入的最适土壤含水量为70%。草莓根结线虫病防治方法选用抗病品种。不同品种对草莓根结线虫病的抗性表现有差异，比较好的品种有丰香、全明星、红颜、甜查理等。选择无病地块。在栽植草莓时注意选择无根结线虫的苗株和田块，如栽植前发现园土中含有病原线虫，要在栽植前和栽植后用杀线虫剂彻底处理。

早光草莓苗、早光草莓苗基地8月5日消息：尽管眼下花卉市场步入淡季，但国内很多地方的苗木购销热度依然不减。自2006年苗木行情开始好转以来，绿化苗木已经了5个年头，今年上半年的苗木行情更创下历史新高，“断货”、“脱销”、“苗荒”成为当前苗木行情的流行语，如此的苗木行情，让很多老资格的苗木都忍不住在心里犯嘀咕：这一轮好行情还能维持多久。

如果是小量种植，尽量不要使用，可以使用大量兑水后的餐具洗涤剂喷洒;也可以在附近放上些香瓜皮，啤酒等等以引开蜗牛等软体爬虫害虫。在秋天，要在植株上铺上一层土，防止霜冻。等土壤上冻后，可以再在植株上铺3-4英寸厚的干草。到第二年的春天，当有新叶子长出后，再移去干草。等天气转暖，并后，在移去植株表层的覆盖土壤。