

麻子仁蛋白 维特生物 麻子仁蛋白溶于水性

产品名称	麻子仁蛋白 维特生物 麻子仁蛋白溶于水性
公司名称	西安维特生物科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市高新区科技二路77号西安光电园B座三单元2802
联系电话	15389067533

产品详情

火麻仁蛋白火麻栽培技术

火麻仁蛋白 火麻栽培技术

2、栽培技术

播种时间与种植区的气候有关。一般来说，在黑龙江，麻子仁蛋白，每年4月中旬至5月底播种，麻子仁蛋白质，而在辽宁，每年4月初播种，但是在山东，春天可以在3月至4月播种，夏天可以在6月播种。有三种播种方法:条播，一般行间距是十二三厘米左右，株间距为七八厘米左右，均匀的进行播种，麻子仁蛋白溶于水性，然后覆盖薄土掩种，即可等待出苗。

火麻仁蛋白的简介

火麻仁蛋白的简介

除了提供人类必须脂肪酸（EFAs）和有一个相当有益的不饱和对饱和脂肪比值，火麻仁是一种容易消化的，不含谷蛋白的极好的膳食性蛋白质来源。它的34.6 g / 100 g 总蛋白质含量和黄豆相当，而多于坚果，其他种子，牛奶制品、肉、鱼或家禽的蛋白质含量。麻仁蛋白质为人类提供一种比例非常均衡的10种必需氨基酸组合。火麻仁蛋白质的一个突出的方面是精氨酸(123mg/g 蛋白质)和组氨酸(27 mg/g 蛋白质)的高含量，两种都对儿童期的生长非常重要，以及合成必须的酶需要的含硫氨基酸胱氨酸(16 mg/g 蛋白质)。火麻仁蛋白质亦含相对高水平的对骨骼肌代谢非常重要的支链氨基酸。

火麻仁蛋白 火麻生长习性

火麻春播秋收，生长期为8个月，宜植于石山区土壤，火麻高达1.5-2米，每年2月种植，8月初开花，10月下旬成熟，收货后晒干保存，一般无虫害。火麻籽为扁圆卵形，长4-5毫米，表面光滑呈棕色或黑色花纹。火麻壳硬而脆，去壳后得到火麻仁。火麻仁富含不饱和脂肪酸、蛋白质、卵磷脂、油酸、亚麻酸、亚纳酸等。

麻子仁蛋白-维特生物-麻子仁蛋白溶于水由西安维特生物科技有限责任公司提供。西安维特生物科技有限责任公司（www.wholefood123.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！