

红袖添香草莓苗、红袖添香草莓苗几年结果

产品名称	红袖添香草莓苗、红袖添香草莓苗几年结果
公司名称	泰安高新区锦瑞苗木园艺场
价格	.40/棵
规格参数	品种:脱毒草莓苗 高度:20cm 规格:三叶一草莓苗
公司地址	泰安市南部开发区
联系电话	13468000001

产品详情

红袖添香草莓苗、红袖添香草莓苗几年结果移栽大田的土壤要精细耕整，做到土松草净，上虚下实，使苗心的茎部与地面持平，苗心不被土壤盖没，栽苗后要将细土压紧，使根土紧贴，防止吊气失水死苗。以上是对降低草莓苗的死苗率的简单介绍，希望对种植户有所帮助。

在腋花芽分化结束后和批果采收后，分别亩追施尿素10kg左右和叶面喷施0.5%的。并及时摘去老叶，保持旺盛生长。白草莓上市销售，早是在，品种名叫“初恋的味道”。这个名字的由来也很少女心：白草莓外表白皙像少女的脸，果籽像一点点少女，而“初恋的味道”在成熟时会变成淡粉色，就好像是的女子遇到了她的初恋，同时也有着强烈的香味，因此而得名。

带1-2个叶原基的茎尖进行培养，分化出的试管苗可有效脱出病。3、花药培养脱，草莓花药培养的时间是草莓现蕾时，摘取mm左右大小的，此时花药直径1mm左右，将采集到的用流水冲洗后，置于铺有湿润滤纸的培养皿中，4 预处理48h。在超净工作台上，将放入70%乙醇中消30s,再转入0.1%贡溶液中消7-9小时，无菌术冲洗3-4次，剥取花药接种在附加一定浓度的6-苄嘌呤和萘的MS培养基上进行暗培养，2周后移至光下培养，40-50天后即可将分化再生的植株接种到附加一定浓度的6-苄嘌呤和丁酸的MS培养基上进行增值培养，然后生根、移栽。

土壤管理.要求有机肥和无机肥合理搭配，发病重的地块应该进行2-3年轮作种线虫不危害的作物，如花生、大豆、芋头、胡萝卜等生物。大芽大砧嫁接,大芽大砧嫁接是近年来出现的一种新的山东草莓嫁接法，嫁接方法同插接，只是在砧木2片真叶1心、接穗2片子叶刚展开时嫁接。这种方法嫁接成活率高，克服了普通插接法由于葫芦幼茎空心，接时易裂开或接后西瓜易在葫芦茎内扎根的缺点。

红袖添香是极早熟草莓品种，植株生长势较强，株态较直立，株高12.96cm；叶椭圆形，叶柄长9.4cm；花序分歧，低于叶面。果实长圆锥形，红色，有光泽，种子黄绿红色兼有，平于果面，种子分布中等；果肉红色；花萼单层双层兼有，主贴副离。一、二级序果平均果重50.6g，果实纵横径6.08cm×4.46cm，果重

98g。

8月23日对象措施咪鲜几丁糖、百泰、代森锰锌、拿敌稳，每次任选两种药交替使用根腐病代森锌、丙环唑、甲托、福美双，每次任选两种药交替使用红白蜘蛛阿维菌素1000倍液、吡虫啉(含量45%)5000倍液，两种复配。草莓苗要常摘老叶，防止病虫。草莓生长过程中，随时有老残和病虫为害的叶片发生，常见病害病、灰霉病、叶斑病、病等，虫害有蚜虫、红蜘蛛等。

定植后管理1.缓苗期管理：活棵前，不能控水，只能控肥。定植时滴灌230000L/666.7m²；移栽至开花期每5-7天滴灌一次，每次滴灌6000-10000L/666.7m²。2.扣棚：气温下降到10℃左右时要及时扣棚保温。扣棚过早会影响花芽分化，过迟则会诱导草莓进入休眠，影响草莓发育和产量。

裸根苗和基质苗裸根苗：裸根苗的价格。大多在露地繁殖，成苗后，把苗子挖出来，抖落泥土，只留苗子植株，有的还要剪掉叶片和多余的根系。优点：重量小，包装、运输、储藏、定植省工，方便。缺点：土壤生产，容易带菌带，生产要求土壤要严格消毒，无病虫害，裸根苗由于根系受损伤大，定植后缓苗慢，生长速度慢，容易受病菌侵害。

红袖添香草莓苗、红袖添香草莓苗几年结果根际施肥取决于植物生长和前一期草莓的果实数量。在正常条件下，使用45N，P，K每15复合肥量约10kg，用喷雾，滴灌肥水。由于光线不足，草莓很脆弱，抗逆性也降低了。为了确保植物在强光和高温下不会因脱水而脱落，需要在眩光前46速榆苏2。高800倍溶液，或0.1倍酯2000倍溶液，以及高钙和其他营养液，以植物抗性。