

月季基地 通辽月季 山林月季树状月季

产品名称	月季基地 通辽月季 山林月季树状月季
公司名称	南阳市卧龙区山林月季种植专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区蒲山镇姚亮村七组
联系电话	13838785333

产品详情

月季的嫁接方法

嫁接还可以真实地反映原品种的各种性状，遗传性和稳定性极强。通过实践观察，嫁接后经过生长发育形成的植株从嫁接之日起至开出朵花，快的只需23天，个别株还可提前1至2天开花，通辽月季，大部分嫁接株通常约需40至45天开花。由此可见嫁接与扦插相比，嫁接可将开花时间提前。

以北京地区为例：6月15日，同日嫁接与扦插，嫁接株在7月25日前后约有20%左右即可开花，而扦插苗于9月20日前后甚至更晚才有10%左右开花。由此可见嫁接的优势是很强的。当然嫁接繁殖操作复杂，技术要求较高。以下就嫁接繁殖的具体问题逐一阐述。

月季的嫁接方法

2.砧木与接穗的嫁接亲和力：

嫁接亲和力是指砧木和接穗内部组织结构、遗传和生理特性的相似性。通过嫁接能够促使植株愈合成活以及成活后生理上相适应。亲和力弱和亲和力强现象的表现方式是比较复杂的。一般来说，月季基地，亲缘关系越近，亲和力越强。同品种或同种间的亲和力强。同属异种间的嫁接亲和力因种类而异。更多月季种植知识联系山林月季

3.砧穗两者形成层：

砧穗两者形成层部分必须有相当大面积的紧密接触，这是嫁接成活的因素之一。理论上将砧穗两者形成层完全吻合是的嫁接效果，月季批发，但实际操作中很难做到，月季怎么批发，只求尽量达到面积的接触即可。

4.嫁接时的温度、水分和氧气条件：

温度是使细胞活动的必要条件，只有细胞的活动，包括细胞分裂才能促进接穗的生长。

通常不同品种的月季，在13 至32 的温度范围内都可使细胞迅速生长。室外嫁接时要选择一年中具有上述温度并且形成层处于旺盛活动的时期。这种条件一般出现于春季、夏初及9、10月份。形成层长出的愈伤组织都是由薄壁而饱满的细胞组成，它们很容易失水变干而使接穗干枯。因此结合部必须绑缚严密，以保持组织的水分。在愈合组织细胞迅速分裂的同时往往伴随着呼吸，这时的氧气是不可缺少的。因此利用塑料带绑缚结合部具有保水和促进呼吸的双重效果。

月季基地-通辽月季-山林月季树状月季(查看)由南阳市卧龙区山林月季种植专业合作社提供。行路致远，砥砺前行。南阳市卧龙区山林月季种植专业合作社（www.shanlinyueji.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为花木具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!