

月季 山林月季 月季种植

产品名称	月季 山林月季 月季种植
公司名称	南阳市卧龙区山林月季种植专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区蒲山镇姚亮村七组
联系电话	13838785333

产品详情

怎样挑选月季

叶片

月季叶片肥大而深绿，有光泽，不卷曲萎缩。叶片上没有褐色污点或黑褐状，也没有白色粉状物。

花

月季四季开花，花多为重瓣，花茎大，形美，花蕾雅秀，花柄长而坚韧。花瓣光亮，大花月季，色艳丰富又具有香味为佳品。分健性花和懒性花两季花。一般情况下，健性花四季常开，月季种植，枝上花朵一凋谢，腋芽就开始长大，枝端又形成花蕾，如春水绿波、全背大红等品种。懒性花一年中只在春季开花一次，特香，如冰轮、德国白等品种。两季花春秋各开一次花。选购时要选择健性花品种。

怎样挑选月季

是美化生活和环境的理想花卉，不管是庭院地栽，月季，或是阳台盆栽都深受群众喜爱。品种优良的，树状月季，应该具备以下一些特征：

枝干与外型

月季枝干外型因品种而异，主要有直立型、扩张型、蔓生性。不论何种株型，生长良好的月季，枝干粗壮强健，呈青绿色，主干下部为灰褐色，新枝多为紫红色。嫩梢无，全株无徒长枝、过密枝、病虫害枝。植株多干，株形美观。

3.砧穗两者形成层：

砧穗两者形成层部分必须有相当大面积的紧密接触，这是嫁接成活的因素之一。理论上将砧穗两者形成

层完全吻合是的嫁接效果，但实际操作中很难做到，只求尽量达到面积的接触即可。

4.嫁接时的温度、水分和氧气条件：

温度是使细胞活动的必要条件，只有细胞的活动，包括细胞分裂才能促进接穗的生长。

通常不同品种的月季，在13 至32 的温度范围内都可使细胞迅速生长。室外嫁接时要选择一年中具有上述温度并且形成层处于旺盛活动的时期。这种条件一般出现于春季、夏初及9、10月份。形成层长出的愈伤组织都是由薄壁而饱满的细胞组成，它们很容易失水变干而使接穗干枯。因此结合部必须绑缚严密，以保持组织的水分。在愈合组织细胞迅速分裂的同时往往伴随着呼吸，这时的氧气是不可缺少的。因此利用塑料带绑缚结合部具有保水和促进呼吸的双重效果。

月季-山林月季-月季种植由南阳市卧龙区山林月季种植专业合作社提供。南阳市卧龙区山林月季种植专业合作社（www.shanlinyueji.com）位于南阳市卧龙区蒲山镇姚亮村七组。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山林月季在花木中享有良好的声誉。山林月季取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。山林月季全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。