

山东日本紫果无花果苗品种纯正

产品名称	山东日本紫果无花果苗品种纯正
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

北京年平均气温11.9℃，1月平均气温-4.7℃，低温-18℃，无霜期180-200d，降水量600-700mm。为了增加叶片面积，加快植株生长，可以在坐果前晚修剪一些侧枝与老功能叶，待植株坐果后，再将侧枝和病叶以及老叶去掉。这样不仅控制了植株徒长，也调节了植株的长势，同时能为植株遮荫，降低地温。试验温室长75m，跨度7.5m，脊高3.3m，后墙高2m，墙体厚0.6m，砖混结构，钢筋拱架，种植面积442m²。

此种树形, 树体矮小, 受风害小, 管理方便, 结果枝不宜多留。栽植当年留干高度为20~30cm, 主枝留3个, 因为辣椒生根慢, 所以要适当施用生根剂促进根系生长, 提高辣椒缓苗速度, 这点是很有必要的。一般是在定植时可用生根剂蘸根或者定植后用生根剂灌根都可以, 另外随水冲施甲壳素类肥料或生物菌肥都可以提高根系的生长发育。并使其向3个方向伸展。在离地面40~50cm位置进行短截。第2年秋各主枝上发出的3个新梢留作结果枝, 剪留长度为20cm。

主枝延长部分背面直立伸长的芽全部剪除, 间隔一距离, 留侧芽伸长, 在日常管理中, 因为施肥过多, 导致根系受损, 无法吸收足够的养分和水分供应植株生长, 所以引起叶片黄化, 在浇水时不当, 一次浇水过多造成田间积水, 极易产生沤根, 也会引起番茄植株黄叶。作为当年结果枝或补充下年结果母枝的数量, 并插竹木杆上引绑缚(向上牵引)。先端再留芽作为主枝继续延长, 株间可不留空隙, 但不能相互穿错过深。