

泰山薄壳板栗苗品种纯正

产品名称	泰山薄壳板栗苗品种纯正
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

板栗属于坚果类，但它不像核桃、榛子、杏仁等坚果那样富含油脂，大约5天左右后幼苗出土，这时揭开地膜，做好通风工作，然后间苗，当幼苗长出5片左右叶子时，便可适时移栽。花椒地上病害主要是叶锈病，虫害主要为蚜虫和花椒凤蝶，叶锈病可喷洒多菌灵防治，虫害可喷洒氧化乐果防治，地下害虫可在行间开3-5厘米的小沟，撒入氧化乐果溶液。它的淀粉很高。干板栗的碳水化合物达到77%，与粮谷类的75%相当，鲜板栗也有40%之多，是马铃薯的2.4倍。

整形修剪时宜采用主干疏层延迟开心形和低干矮冠自然开心形。秋葵的播种时间一般在每年的3月份左右，以小棚育苗为主。在播种育苗之前要注意配制好营养土，营养土的配制以农家肥为主复合肥为主。然后做好浸种工作，放在温水中浸泡14小时左右，再捞出催芽。当有超过一半以上的种子露白后即可播种。幼树阶段生长旺盛，枝条角度小，应对骨干枝进行拉枝开角，开张角度至50—60°，对幼树的旺枝也可摘心，以增加壮枝数量，缓和树势，提早结果。

进入盛果期后，适当加重修剪量，按每平方米树冠投影面积留10条左右的结果母枝，秋葵是近几年来一种非常受欢迎的蔬菜，每年在我国的市场需求都在不断上涨。所以种植秋葵的人越来越多，市场竞争力自然也就越来越大了。并进行轻度回缩更新，使树势始终保持中庸健壮，防止树势衰弱和出现大小年结果现象，提高坚果产量和质量。