

山东地区无籽大十果桑苗品种纯正

产品名称	山东地区无籽大十果桑苗品种纯正
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

桑葚树修剪后，地上部分，如枝、芽、叶的数量减少，剩余部分通风透光条件得到改善，一般在苗期注意猝倒病，一发现及时喷洒多菌灵。后期需要注意鼻涕虫危害，可以在植株附近撒食盐和生姜粉避免靠近。发现菜青虫要重点喷撒Bo.t.乳剂或青虫菌六号液剂防治。养分集中，叶片光合作用强度提高，因而促进了局部生长。这种局部促进作用的大小取决于修剪强度，其强度越高

树姿开张。枝条柔软易弯曲，皮灰色，节间直。叶卵圆形，较大。剪梢时要留好剪口芽，在剪口芽上方1cm处下剪，剪成马蹄形斜面。剪下的顶梢要及时拣出烧掉，可杀死一些病虫害。在采收秋葵时要注意观察秋葵是否达到了采收标准。首先要保证果荚坚韧、色泽明亮、膨大且未老化。秋葵的采收标准会随着温度的变化而有所不同，在高温时，秋葵果荚的长度大约在10厘米左右，而温度较低时，长度大约只有8厘米。并且还要根据使用方向来控制好标准，不过不管是什么使用方向。果桑树整枝就是用桑剪或锯修去桑树上的纤、利用石灰堵塞树洞等。冬芽盾状饱满，灰褐色，芽尖离，有副芽。花芽率98%，单芽着果数5~6个，根系发达，深根性。

平原地区一般采用株行距2m × 3m的栽植密度，每亩栽植111株；秋葵作为近几年来兴起的一种蔬菜，在我国有着的受欢迎程度是非常高的。种植秋葵也成为了很多人脱贫致富的主要项目。随着市场需求的增加，秋葵的产量及种植面积也会要有所上涨。山地、丘陵等地可采用株行距1.5m × 3m的栽植密度，每亩栽植148株。