

南京儿童口罩可分解致癌芳香氨染料检测

产品名称	南京儿童口罩可分解致癌芳香氨染料检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662582169 业务电话:18662582169 测试中心:18662582169
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

如果儿童用了成人的口罩，那么可能会导致贴合不严密，起不到保护作用。其次儿童口罩用的材质是透气性好的，因为儿童年纪较小，对呼吸阻力的耐受性差，儿童的呼吸力度和成人相比差距较大，如果呼吸阻力太大，长时间配戴会造成不同程度的缺氧，对儿童的大脑和身体健康都容易造成影响，因此在选择儿童口罩时，一定要选择儿童专用口罩。

儿童口罩检测，GB/T38880-2020新标准检测

提供 GB/T38880-2020 标准检测 各类口罩检测

《儿童口罩技术规范》推荐性国标规定了适用于6岁至14岁儿童用口罩的基本要求、外观质量和测试方法，同时提出了19项主要

对于安全性能，《儿童口罩技术规范》提出，口罩应能安全牢固地罩住口、鼻、下颌，不应存在可触及的锐利端和锐利边缘，不应明显影响视野；口罩原材料不得使用再生料和可导致不良反应的材料，不应经过有氯漂白；配有呼吸阀的口罩，其呼吸阀应牢固不变形，内部件不应脱落；不应使用系带式口罩带；鼻夹应承受20次对折不断裂；口罩内层材料不应印花或染色。同时，标准严格规定了有害物质残留，甲醛含量不高于20mg/kg；口罩外层的印花图案不应掉色，禁用可分解致癌芳香氨染料；环氧乙烷灭菌残留量不得高于2 μg/g；不得检出可迁移性荧光增白物质。标准对于儿童口罩的使用给出了明确的佩戴安全警示。比如：儿童应在成年人看护下佩戴口罩，看护人应注意观察并教育儿童正确佩戴口罩。儿童佩戴口罩期间不应打闹或进行中等和中等以上强度运动，不应拆卸呼吸阀及呼吸阀内部件；如佩戴期间出现呼吸不适、皮肤过敏等症状，应及时摘脱口罩，必要时应立即就医。口罩应及时更换，不建议口罩洗涤后重复使用，已使用的口罩不能交换等。出现呼吸困难儿童不建议佩戴口罩。此次发布的《儿童口罩技术规范》国家推荐标准，是由中国产业用纺织品行业协会（以下简称“中产协”）牵头制定的我国儿童用口罩国家标准，为正确选择和佩戴儿童口罩、规范行业竞争秩序、加强市场监管提供了依据，为儿童口罩生产企业提供了技术支持和标准保障。

防护性能方面：

儿童防护口罩要求颗粒物过滤效率不低于95%；

防护效果不低于90%；

儿童卫生口罩要求颗粒物过滤效率不低于90%；

细菌过滤效率不低于95%。

舒适性能方面：

儿童防护口罩要求呼气阻力和吸气阻力均不高于45Pa；

儿童卫生口罩要求通气阻力不高于30Pa。

安全性能方面：

口罩应能安全牢固地罩住口、鼻、下颌，不应存在可触及的锐利端和锐利边缘，不应明显影响视野；

口罩原材料不得使用再生料和可导致不良反应的材料，不应经过有氯漂白；配有呼吸阀的口罩，其呼吸阀应牢固不变形，内部件不应

脱落；

不应使用系带式口罩带；鼻夹应承受20次对折不断裂；口罩内层材料不应印花或染色。标准严格规定了有害物质残留，甲醛含量不高

于20mg/kg；

口罩外层的印花图案不应掉色，禁用可分解致癌芳香氨染料；环氧乙烷灭菌残留量不得高于2 μg/g；

不得检出可迁移性荧光增白物质。