郑州草莓苗批发基地

产品名称	郑州草莓苗批发基地
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	.45/棵
规格参数	品种:牛奶草莓苗 成活率:95% 基地:创隆园艺场
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

创隆园艺场经过多年试验和实践，探索出防控草莓炭疽病育苗技术。采用农药组合与雨后及时喷药、遮阳避雨栽培、多效唑调控等措施，有效控制了草莓炭疽病危害。

苗床准备 选择土质疏松、排灌方便、不积水的田块做苗床，不能连作。采用棉隆熏蒸土壤法或石灰氮太阳能高温消毒法对土壤消毒。高温季节整地翻土，每平方米均匀撒施98%棉隆微粒剂20～30克，或者每亩均匀撒施石灰氮70～100公斤，然后耙细土壤浇水，保持土壤水分在60%左右，覆盖塑料薄膜密闭15天以上，揭膜7天后待用。苗床在冬季耕翻，母株定植前15～20天再深翻一次，经3～5天暴晒。每亩撒施腐熟饼肥200公斤或有机肥1000公斤，施肥后耕翻，做宽1.5～2米的畦、沟深20厘米，畦面整平。

母株选择和消毒 选用脱毒组培苗和专用母株。专用母株应在上年10月份选取无病健壮苗，用凯润250克/升吡唑醚菌酯乳油800倍液浸苗2分钟消毒，晾干后假植在母株园中培育越冬，3—4月移植母株时按上述标准和方法再次处理，剔除有病和叶片过小的母株。

母株定植 尽早移植，在出梅前繁育出足量的子苗。定植株距为50厘米，使用组培苗的可放宽至70厘米。避免栽植过深，不能将心叶埋入土中，以防烂芽。定植后浇水或浇施稀薄人粪尿，促进活棵。

肥水管理 前期（6月底以前）保持土壤湿润，适时施肥，促发匍匐茎。后期（8月上旬以后）适当控制肥水，促进花芽分化。母株成活后（5月上旬）喷施50～100毫克／升赤霉酸溶液，间隔7～10天再喷一次。根据土壤肥力和子苗长势薄肥勤施，每隔10～15天浇施0.3%尿素或复合肥溶液，或者趁雨天每亩撒施尿素或复合肥5～10公斤；也可以结合病虫害防治，喷施0.3%磷酸二氢钾溶液或叶面肥。匍匐茎发生的*适土壤相对含水量为80%，注意旱灌涝排。

匍匐茎、子苗管理 及时摘除花茎，结合除草清理枯叶和病叶。及时整理匍匐茎和压蔓，使其均匀分布，保持通风透光。苗布满畦面后（约7月上中旬）割除母株，密的地方挖苗假植，使苗均匀分布，减少发病。7月上旬子苗布满畦面时喷施100毫克/升多效唑溶液，间隔15天再喷一次，提高植株抗性。

防除草害 育苗前期及时中耕除草。匍匐茎布满大部分空地且子苗扎根后挑除杂草，注意不要翻动已扎根的子苗。

喷药预防 目前预防草莓炭疽病效果较好的药有大生80%代森锰锌可湿性粉剂、使百克25%咪鲜胺乳油、百泰60%唑醚·代森联水分散粒剂、凯润250克/升吡唑醚菌酯乳油等。露地栽培，在5—6月每隔7～10天喷一次药，7—8月每隔5～7天喷一次药，交替用药。7—8月高温期，在阵雨后补喷一次药。叶面、叶背、匍匐茎均要喷到。

环境调控预防 采取避雨遮阳栽培方式。6月底盖膜避雨；7月高温期覆盖60%遮阳网，或在育苗地搭建遮阳棚；高温期覆盖60%遮阳网，日盖夜收，防病、防热害。