

## 脱毒草莓苗批发价格；品种草莓苗基地批发--览表

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 脱毒草莓苗批发价格；品种草莓苗基地批发--览表      |
| 公司名称 | 泰安高新区北集坡创隆园艺场                |
| 价格   | .45/棵                        |
| 规格参数 | 品种:牛奶草莓苗<br>成活率:95%<br>产地:山东 |
| 公司地址 | 山东省泰安市北集坡街道季家庄村              |
| 联系电话 | 18763831510 18763839889      |

### 产品详情

棚室种植草莓，棚内高温高湿的环境条件，极有利于各种病虫害的发生。因此，加强对病害的综合防治，是实现棚室草莓高产稳产的关键环节。

一、叶枯病 主要为害叶片、叶柄、果梗、嫩茎和萼片。在叶片上先形成紫褐色、周缘不明显、不规则的斑点，继而扩大成3 - 4毫米长的不规则病斑，一叶上如果发生多个病斑，全叶呈暗色，进而呈黄褐色并枯死。在病斑中有散生小黑点。果梗和叶柄上病斑黑褐色，\*初呈斑点状，后扩大成条状。防治对策：及时摘除病叶、老叶。发病初期用70%百菌清可湿性粉剂500~700倍液喷雾，10天后再喷1次，或每亩用70%代森锰锌可湿性粉剂200克加水75公斤喷雾。

二、白粉病 主要为害叶片、花、果、果梗、叶柄和匍匐茎。叶片受害，初期叶背出现薄霜状白粉，以后扩展至全株，随着病势加剧，叶片上卷呈汤匙状；花蕾、花瓣受害呈紫红色，不能开花或不能完全开花；果实染病，果面覆盖白色粉状物，不膨大，瘦长形，幼果失去光泽、硬化。防治对策：在发病初期，及时用粉锈宁2500~4000倍液防治2~3次，采收

后全园割叶，喷70%甲基托布津1000倍液或50%退菌特800倍液。

三、灰霉病 主要为害花朵、花瓣、果实和叶片。在果实上，从果基近萼片处开始发病，初期病斑呈水渍状，渐渐变褐，形成褐色长形病斑，后期逐渐扩大，密生灰霉，使果实软化、腐烂；花受害时，花瓣变褐色，干枯；果梗、叶柄受害时，初期变褐色，后长出灰霉，\*后腐烂干枯，严重影响产量。防治对策：现蕾到开花期，用25%多菌灵可湿性粉剂300倍液、70%甲基托布津800倍液、50%速克灵800~1000倍液等喷雾。在多雨季节，可用“一熏灵”烟熏剂熏蒸防治，隔10~15天熏蒸1次。

四、根腐病 受害植株从下部叶片开始，叶缘变成红褐色，逐渐向上凋萎，\*后枯死。防治对策：草莓移栽前用40%芦笋青粉剂600倍液浇于畦面，然后覆土、移栽。

五、黄萎病 感病植株地上部生长不良，该病主要症状是幼叶畸形，变狭小，呈舟形，叶片变黄、表面粗糙无光泽，叶缘变褐色向内凋萎，直到枯死。防治对策：实行轮作，严格引入无病植株种植；缩短更新年限；已发病植株必须拔除烧毁。草莓移栽前用40%芦笋青粉剂600倍液或用70%甲基托布津700倍液进行土壤消毒杀菌。

六、病毒病 染病植株表现为植株矮化，叶片变小，小叶叶缘锯齿尖锐，心叶有黄化；开花提早，果实变小，产量下降；匍匐茎抽生数减少。防治对策：选用无病毒苗，2~3年轮换1次无病毒苗，同时加强蚜虫防治。

注意 在药剂防治的基础上，还要加强农业防治。及时通风降低棚内湿度，加强肥培管理，培育健壮植株，提倡轮作，选用无病毒苗，棚四周开好排水深沟，保证雨停沟干，及时拔除病株，摘除病叶、老叶和病果等。