## 血桃树苗新品种、血桃树苗价格、

产品名称	血桃树苗新品种、血桃树苗价格、
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	4.50/棵
规格参数	品种:血桃树苗 规格:一公分 基地:创隆园艺场
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

## 产品详情

创隆园艺场桃树夏剪技术 1、摘心。将枝条顶端的小段嫩叶梢连同嫩叶一起摘心。一般 当新梢生长到25厘米左右时摘心。主要摘除主枝附近的竞争枝、内膛徒长枝芽。摘心一般 每年进行三次,\*次约5月中旬—6月上旬,第二次在6月下旬—7月上旬,第三次在8月下旬 —9月上旬。对旺树、旺枝可早摘多次,反之弱树、弱枝可迟摘、少摘或不摘。

- 2.拿枝。在新梢半木质化初期,将直立生长的旺枝条,用手从基部到顶部捋一捋,不伤木质部,把枝条扭伤。
  - 3、拉枝。自早春萌芽后直到9月份约可拉枝,以7-8月份进行效果更好。
- 4. 疏枝。5月中旬—6月中旬,幼树和结果期树下部枝梢过密时,应疏去过密技、下垂技和竞争枝,使结果枝在结果的同时,抽生健壮的新梢。
- 5、环剥环切。主要针对铺养技以及直立长枝组和因生长过旺未结果的树进行 环剥或环节,重刻伤,以增加伤口上部的营养积累,以便提高花芽质量和结实能力。但忌

在主杆上进行,时间掌握在5月中旬—6月中旬为宜。

6、控制促花。从7-8月开始喷2-3次促花王,对坐果率差的品种,幼果期和新梢旺长期时,各喷1次促花王,效果更好。

幼树期的土壤改良 桃树垂直根较浅,而水平根发达,大量根系分布在地下15~45厘米处,80厘米以下根系很少。桃树栽植后1~4年中,每年秋季都要通过深沟肥改良土壤,沟的深度由\*年的40厘米逐年加深,到第4年为60厘米。沟宽为50~60厘米。用4年的时间将全园土壤全部改良。4年之后不须再大量的深施肥,只需地表施肥或轮换穴施,以保护浅层根系。

桃树穿孔病常见的有细菌性穿孔病、真菌性霉斑穿孔病、褐斑穿孔病。病重时能引起大量落叶,削弱树势,降低产量并影响次年结果。

## 一、发病规律

1.细菌性穿孔病:病菌在枝条病组织(主要是春季溃疡病斑)内越冬。次年桃树开花前后病菌从病组织溢出,随风、雨或昆虫传播,经叶片、果实和枝条的皮孔入侵。叶片于5月发病,秋季多雨可再次侵染。温暖、雨水频繁或多雾季节适于病害发生。树势衰弱或排水不良及偏施氮肥的果园发病重。晚熟品种发病重,早熟品种发病轻。

- 2.霉斑穿孔病:是由真菌引起的病害。病菌在病枝梢或芽内越冬。次年春天病 菌借风、雨传播,先侵染幼叶,产生新生孢子再侵染枝梢和果实。低温多雨有利发病。
- 3.褐斑穿孔病:是由真菌引起的病害。病菌主要在病叶和枝梢中越冬。翌年春天形成分生孢子,借风、雨传播,侵染叶片、新梢和果实。

## 二、防治技术

1.加强果园管理:结合冬剪,彻底清除枯枝落叶和落果,以消灭越冬菌源。加强肥水管理,增施有机肥,注意通风透光,增强树势,提高树体抗病能力。

2.发芽前喷5波美度石硫合剂。在7月喷30%的高生悬浮剂800-1000倍液,对这几种穿孔病均有防效。