

血桃树苗新品种、血桃树苗价格、

产品名称	血桃树苗新品种、血桃树苗价格、
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	4.50/棵
规格参数	品种:血桃树苗 规格:一公分 基地:创隆园艺场
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

创隆园艺场桃树夏剪技术 1、摘心。将枝条顶端的小段嫩叶梢连同嫩叶一起摘心。一般当新梢生长到25厘米左右时摘心。主要摘除主枝附近的竞争枝、内膛徒长枝芽。摘心一般每年进行三次，*次约5月中旬—6月上旬，第二次在6月下旬—7月上旬，第三次在8月下旬—9月上旬。对旺树、旺枝可早摘多次，反之弱树、弱枝可迟摘、少摘或不摘。

2、拿枝。在新梢半木质化初期，将直立生长的旺枝条，用手从基部到顶部捋一捋，不伤木质部，把枝条扭伤。

3、拉枝。自早春萌芽后直到9月份约可拉枝，以7 - 8月份进行效果更好。

4、疏枝。5月中旬—6月中旬，幼树和结果期树下部枝梢过密时，应疏去过密枝、下垂枝和竞争枝，使结果枝在结果的同时，抽生健壮的新梢。

5、环剥环切。主要针对铺养技以及直立长枝组和因生长过旺未结果的树进行环剥或环切，重刻伤，以增加伤口上部的营养积累，以便提高花芽质量和结实能力。但忌

在主杆上进行，时间掌握在5月中旬—6月中旬为宜。

6、控制促花。从7 - 8月开始喷2 - 3次促花王，对坐果率差的品种，幼果期和新梢旺长期时，各喷1次促花王，效果更好。

幼树期的土壤改良 桃树垂直根较浅，而水平根发达，大量根系分布在地下15~45厘米处，80厘米以下根系很少。桃树栽植后1~4年中，每年秋季都要通过深沟肥改良土壤，沟的深度由*年的40厘米逐年加深，到第4年为60厘米。沟宽为50~60厘米。用4年的时间将全园土壤全部改良。4年之后不须再大量的深施肥，只需地表施肥或轮换穴施，以保护浅层根系。

桃树穿孔病常见的有细菌性穿孔病、真菌性霉斑穿孔病、褐斑穿孔病。病重时能引起大量落叶，削弱树势，降低产量并影响次年结果。

一、发病规律

1.细菌性穿孔病：病菌在枝条病组织（主要是春季溃疡病斑）内越冬。次年桃树开花前后病菌从病组织溢出，随风、雨或昆虫传播，经叶片、果实和枝条的皮孔入侵。叶片于5月发病，秋季多雨可再次侵染。温暖、雨水频繁或多雾季节适于病害发生。树势衰弱或排水不良及偏施氮肥的果园发病重。晚熟品种发病重，早熟品种发病轻。

2.霉斑穿孔病：是由真菌引起的病害。病菌在病枝梢或芽内越冬。次年春天病菌借风、雨传播，先侵染幼叶，产生新生孢子再侵染枝梢和果实。低温多雨有利发病。

3.褐斑穿孔病：是由真菌引起的病害。病菌主要在病叶和枝梢中越冬。翌年春天形成分生孢子，借风、雨传播，侵染叶片、新梢和果实。

二、防治技术

1.加强果园管理：结合冬剪，彻底清除枯枝落叶和落果，以消灭越冬菌源。加强肥水管理，增施有机肥，注意通风透光，增强树势，提高树体抗病能力。

2.发芽前喷5波美度石硫合剂。在7月喷30%的高生悬浮剂800-1000倍液，对这几
种穿孔病均有防效。