

泰安白皮松移栽管理

产品名称	泰安白皮松移栽管理
公司名称	泰安开发区忠信苗圃
价格	40.00/棵
规格参数	
公司地址	泰安开发区北集坡镇季家庄村
联系电话	86-0538-8913236 15853828236

产品详情

栽培地点应选在地势稍高燥、土壤疏松、排水通气良好的地方。低洼积水或土壤黏重之处，可事先筑高台或换土后栽植。庭园绿化观赏多选用大苗，移植土球应为根径的10~12倍，白皮松由于主根长，侧根稀少，故移植时应少伤根。栽前树穴内应施足基肥，新栽树木要立支架，以防被风刮倒。一般来说，2年生苗高约10cm左右，应进行第1次裸根移植；4~5年生苗木高约30~50cm，可进行第2次移植，应带土团；10年生苗高达1m以上，可带土团再移植1次，以培养大苗，供城市园林绿化用。对主干较高的植株，需注意避免干皮受日灼伤害。白皮松主要害虫有松大蚜并诱发黑霉病，可用40%氧化乐果1000~1500倍液进行防治。

孤植应用的白皮松，侧主枝的生长势较强，中央领导干的生长量不大，故形成主干低矮、整齐紧密的宽圆锥形树冠，直到老年期也能保持较完整的体态。对此类树一般不进行整形修剪，只是把枯病枝、影响树形美观的枝条剪除即可。密植的白皮松则因主侧枝生长少，而中央领导干高生长量大，中心主枝优势较强，能形成高大的主干或圆头状树冠，整形时主要控制中心主枝上端竞争枝的发生，及时疏除竞争枝，扶助中心主枝加速生长，以形成理想树形。

白皮松频繁的浇水使苗木根系受损，会使土壤中的含氧量下降，根系的呼吸遭到影响，加之厌氧菌的繁殖，将会致使树根陈腐。没有足够的养分供给造成枯死。准确的办法就是栽植后马上浇足浇透头水，一星期后浇二水，再过10天后浇三水，此后可根据本地气候状况和土壤情况浇水。

所以在移栽时白皮松种植的深度尽可能多的考虑他的生长特性，以及当地的土壤和气候情况，不能和其他苗木移栽一样，同样如果过大的白皮松也需要进行固定，以保证不被风吹倒或者遭恶意损坏，春秋正是苗木休眠的时候，也是我们移栽的好时候。我场坐落于世界文明的泰山脚下，风景秀丽，卫生城市，北靠省府济南，南邻孔子故里曲阜，有着山美水美人更美得传统美誉，京沪高速，京福高速，京沪高铁

从横交错，交通极为方便，我场苗木销售全国各地，山东素来被称为“南木北牵，北木南移”之地，南方的苗木需要在山东落脚养护，再运往北方，这样才能保证苗木的成活率。今年基地出圃白皮松10000棵规格1米至5米 树形优美 冠幅丰满 移栽专业 回程车调配及时。