

哈尔滨美甲批发：哈尔滨美睫与接触性皮炎

产品名称	哈尔滨美甲批发：哈尔滨美睫与接触性皮炎
公司名称	哈尔滨透笼轻工批发市场叛逆壹族美甲商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	哈尔滨透笼轻工批发市场3H2-19号

接触到过敏原，发生过敏反应，引发皮肤炎。只发生在过去曾对过敏原反应，获得免疫系统的特定人群上。抗原的产生需要约1周以上的时间，所以对第一次接触到的物质是不会反应的。接触到过敏原后，可能几小时，或1天，时间长时2、3天后才出现症状，因人而异。

常见的过敏原有漆树、樱草等植物和金属。诊断时需要进行详细的问诊推断原因物质，也需要进行斑贴测试。接触性皮肤炎中有一种是单纯的接触不会出问题，要在紫外线的照射下才会引发症状。

这种称作“光接触性皮肤炎”，可分为“光刺激性接触皮肤炎”和“光过敏性接触皮肤炎”两种。裸露在日光照射的部位会出现反应，诊断时需要进行光斑贴测试。

接触性皮肤炎的原因物质(包括接触性荨麻疹的原因) 水果...芒果、蜜瓜、奇异果、无花果等 植物...漆树、银杉、银桦、桉树、无花果等 金属...手表带、硬币、项链、戒指、耳环、衣服扣、牙科治疗用的金属填充物等(材质是镍、铬、钴等) 钛据说

化妆品...美甲、洗甲水、保湿剂、染发剂、烫发液、除汗剂、香水、防晒霜等 微生物...细菌、霉菌、灰尘等 其他...橡胶制品、衣服、灯油、药膏、护创膏、湿布、胶带等 诊断

皮肤科专科医生可以根据症状大概诊断接触性皮肤炎，但是为了更加确定，防止下次再出现同样的症状，在详细检查时需要进行斑贴测试，找出过敏原。斑贴测试有已经对应过敏原事先制作好的贴片也直接贴上过敏物质进行测试的。原则上48小时内能确定，但需要精通斑贴测试的医师

进行诊断。接触性荨麻疹可能用斑贴或针刺测试等15~20分钟即可判定。治疗及预防品 在斑贴测试前进行治疗。避免接触引起过敏的物质，涂类固醇药膏。症状严重时可能需要内服类固醇。原因明确后，约1周左右症状可以改善，痊愈后可停止治疗。

QLI 治疗过敏性接触性皮肤炎，首先得完全回避过敏原。但还是有必要进行斑贴测试，找出过敏原。刺激性接触性皮肤炎治疗时，虽然应该避开原因物质，但是有些物质与职业相关，难以完全避免，这种时候可以戴手套。

文章标签：[哈尔滨美甲培训](#) [哈尔滨美睫培训](#) [哈尔滨皮肤管理](#) [哈尔滨美睫培训学习](#)

文章来源：[哈尔滨美睫与接触性皮肤炎:http://www.hrbpn.com/wt/217.html](http://www.hrbpn.com/wt/217.html)