

# 吉塞拉矮化樱桃苗品种介绍、吉塞拉矮化樱桃苗出售价格

产品名称	吉塞拉矮化樱桃苗品种介绍、吉塞拉矮化樱桃苗出售价格
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	6.00/棵
规格参数	品种:樱桃 规格:一公分 产地:山东
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

## 产品详情

### 一、樱桃苗什么品种好？

1、奇早樱桃樱桃苗：2016年通过山东省林木品种审定委员会审定。是目前生产中特早熟品种之一，红色、味甜，平均糖度在21度，自花授粉结实率高。果个大，整齐度高，平均单果重11.5g，大果重15.9g;果形心形，果，稍凹陷;果柄中长，果实红色至暗红色，有光泽。果核小，可食率96.1%。果实发育期35天左右，泰安地区5月3号左右成熟，果子成熟一致，不裂果，无畸形果。

2、樱3号樱桃苗是山东果科所推出的特大果形新品种，美早和萨米脱的杂交后代，是目前国内非常有潜力的新品种，是一个中熟品种，在山东泰安地区成熟期在5月下旬。形态特征果实宽心脏形，果顶较平，稍内陷，偏向于美早的果形，脐点较大，果实横径、纵径较大，侧径较小。果个大，平均果重13-14g，单果大16g，果皮深红色，完全成熟呈紫红色，有光泽，果肉肥厚多汁，甜度极高，肉质硬，风味上等，可溶性固形物18.3%，果实可食率94.6%，果柄中长，无畸形果，丰产性极强。

### 3、车厘子

樱桃苗种源车厘子是Cherry的音译，它是一种国外的樱桃，属于大樱桃，主要分布在美国、加拿大、智利、澳洲、欧洲等地，目前国内也逐步在发展，而早传入中国是1871年，美国传教士J.L.Nevius引入大樱桃在烟台栽培，主要是红灯和美早两个品种。车厘子品种很多，主要大樱桃的品种有：红灯，红蜜，艳阳，早红，先锋，拉宾斯，黄蜜，美早，那翁等。比较常见的车厘子品种是宾莹车厘子，其次是霖宝车厘子，宾莹果实呈暗红色，皮厚坚挺，弹性很好味甜。霖宝果实呈淡黄色，果实细腻，多汁。

4、珍珠樱桃苗是中国樱桃的芽变优株，1993年重庆南方果树研究所选出，因成熟时果皮紫红发亮而得名。黑珍珠樱桃果实大，平均果重4.5克。果形近圆形，果顶乳头状。皮中厚，蜡质层中厚，底色红，果面

紫红色，充分成熟时呈紫黑色，外表光亮似珍珠。果肉橙黄色，质地松软，汁液中多，可溶性固形物含量22.6%，糖17.4%，酸1.3%，风味浓甜，香味中等，品质极上。半离核，可食率90.3%。在重庆地区1月下旬至2月上旬萌芽，2月中下旬开花，4月中下旬果实成熟，11月下旬落叶。

5、美国一号樱桃苗：“美国一号”表现优异，果个大，色泽好，嫁接在吉塞拉砧木上，栽植后第二年结果，成花坐果率高，丰产性好。平均单果重10.80g，大果重达20.4g；果色红，品质好，果实商品价值高。幼树结果期早，丰产稳产，无明显的病毒病，裂果轻，示范推广面积大，具有很高的经济效益和社会效益，经过十余年的多途径的观察、选育、试验示范，确定其是各项指标均优于美早的优良品种。

6、俄罗斯8号樱桃苗：俄罗斯8号是从俄罗斯引进新品大樱桃苗木，俄罗斯8号大樱桃果实宽心脏形，双肩凸起、宽大，有胸凸。成熟时果实颜色从鲜红色渐至黑紫，油润黑亮，果肉甜，果柄细长，果个较大，平均单果重12.9克，果皮厚韧，弹性强，甜香味浓。6月上旬开始成熟。俄罗斯8号为甜樱桃品种中的佼佼者，综合性状明显优于目前推广的名优品种沙梅豆、美早、红灯等。俄罗斯8号大樱桃风味香甜，相当于和优于“佳红”，大樱桃丰产性极强。

7、美早樱桃苗：树势强健，树姿半开张，果实大，平均单果重9克左右。果形宽心脏形，大小整齐，顶端稍平。果柄特别短粗。果皮全紫红色，有光泽，鲜艳美观，充分成熟时为紫色。果个略大于红灯，风味比红灯好。果型宽心脏形，大小整齐，果顶稍平，果柄较粗短。具有果柄粗长，肉硬，耐贮运，花期耐低温，腋花芽多，丰产，抗裂果，成熟期一致，一次即可采收完毕等特点，是一个果大、质优、肉硬、耐贮运、丰产的早熟樱桃的优良品种。

总结：至于樱桃苗什么品种好，要从各方面综合，比如种植户说：多卖钱的品种就是优质品种，消费者说果个大、口感好的品种就是好品种。小编说，要从果实大小、色泽、糖度、耐贮藏性、以及早实性、丰产性、抗逆性进行综合评价，没有十全十美的品种，至于哪个品种好，大家可以根据实际情况选择。

## 二、樱桃树苗的种植方法

### 1、种植密度

樱桃树苗栽植密度应依品种、砧木、土壤条件而不同。在肥沃的平地上，中国樱桃采用Y字形整形密植，可按1×3米，每亩栽220株，若采用自然丛状形或自然开心形整形，可按2~3米×3~4米。幼年期可适当加大密度，成园后采取间伐措施处理。樱桃树苗栽植前应进行土壤深翻熟化，挖大栽植穴。每穴施入有机肥25~50千克。将肥料与土壤拌匀后，再栽苗，并立即浇定根水。

### 2、幼苗处理

栽植前对樱桃树幼苗进行定干和根系护理，将苗子距茎基部60-80公分处截干为后期树型做准备，将苗子的主根和破根病根剪去。

种植什么樱桃树苗品种好：建议种植的樱桃苗品种有：美早樱桃苗，俄罗斯8号樱桃苗，布鲁克斯樱桃苗，奇早樱桃苗，桑提娜樱桃苗，福晨樱桃苗，柯迪亚樱桃苗，瑞德樱桃苗，黄蜜樱桃苗，萨米脱樱桃苗

，拉宾斯樱桃苗，红灯樱桃苗，早大果樱桃苗，雷尼樱桃苗，黑珍珠樱桃苗等优质樱桃苗。大棚内栽植美早，布鲁克斯，萨米脱比较好，大田内合理密植有助于产量的提高。

### 3、种植时间

樱桃树苗栽植时间：一年当中有两次适宜开春发芽前和秋天白露过后。北方冬天会冻土都是春栽，南方温暖栽后小苗迅速走根减少了缓苗期，提高了成活率及第二年春天很多小苗会提前发芽生长（我们这个地方较适宜秋栽）。秋季从落叶期11月份到次年4月份，秋季栽植樱桃苗先养根春季长树，在种植樱桃苗时先用生根粉泡根15公分左右促进根部的补水，有助于提高成活率，车厘子大樱桃在南北方种植是有差异的，选择适合本地区的大樱桃树苗品种进行栽植，

### 4、灌水管理

水肥管理大樱桃什么植株的含水量为70%左右，因此对水分的需求特别敏感。在通常情况下，枝叶多、温度高时要勤浇水，否则园土过干会影响其生长和开花结果。应掌握薄肥勤施的原则。建议喷施新高脂膜增强肥效利用率。

樱桃树苗的土壤管理，据试验观察认为：以春季灌水加覆盖，其它季节进行中耕除草的管理方法较好。由于覆盖减轻了春旱对植株的影响，对果实生长有良好作用。在车厘子采收后，拆除或翻埋覆盖物。据计算，一般成年园每亩应覆盖2000~2500千克麦秆为宜。

### 5、施肥管理

樱桃树苗一年应施肥3~4次。即：樱桃树苗采果后施肥主要是为恢复树势，促进花芽分化，提高来年产量。在采果后立即施入厩肥、禽畜粪尿，并加入适量化肥。每株视结果多少施禽畜粪30~60千克。

樱桃树苗萌芽开花前施肥：追施速效性氮肥为主的肥料。每株施禽畜粪水15~20千克，或尿素0.5千克。  
樱桃树苗果实速长期施肥  
在谢花后，进入果实发育。对结果大树应追施速效性化肥一次，并配合适量的磷钾肥料。

樱桃树苗施好基肥：秋季9~10月（南方温暖地区可在10~11月）落叶前施好基肥，以复壮树势，增加植株体内贮藏养分含量。由于车厘子从开花到果实成熟仅需40余天，贮藏养分的多寡在较大程度上影响着果实的大小和品质。因此基肥的施用非常重要，需占全年施肥量的50~70%。应以有机肥为主，如堆肥、圈肥、鸡粪、腐熟豆饼等，并应适量加入过磷酸钙或钙美磷肥等。

除上述土壤施肥外，樱桃树苗在初花期至盛花期相隔10天一次，连续喷两次0.5%尿素，或600倍磷酸二氢钾液，或0.3%硼砂液，有助于提高坐果率。

### 6、病虫害防治：危害樱桃树苗的主要病虫害

有桑白蚧、刺蛾、桃

红颈天牛、苹果透翅蛾、金缘吉丁虫、金

龟子、梨小食心虫和炭疽病

、樱桃叶斑病、细菌性穿孔病、流胶病、根颈腐烂病等，应采取综合措施加以防治。在冬季修剪时，剪除并烧毁病虫枝，同时在落叶期喷布波美5度石硫合剂一次；在春梢叶片停长前，喷40%乐果1200倍液加70%甲基托布津800倍液一次；7~8月喷50%马拉松乳剂1000倍液加65%代森锌400~500倍液一次。

