

甜查理草莓苗基地介绍

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 甜查理草莓苗基地介绍 |
| 公司名称 | 泰安开发区忠信苗圃 |
| 价格 | .23/棵 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泰安开发区北集坡镇季家庄村 |
| 联系电话 | 86-0538-8913236 15853828236 |

产品详情

泰安开发区忠信苗圃是山东省建园较早的草莓园，合作社自创立以来，一直秉承“精益求精、诚实守信”的理念，恪守“开拓进取，诚信为本，以客户的需求为”的宗旨，集科研、繁育、推广于一体，并拥有近30年的育苗经验。多年来专门从事草莓苗品种的选育、试种和推广工作。

基地面积面积100余亩，草莓苗100多万株，其中有红颜、章姬、甜宝、奶油、牛奶、丰香、宁玉、小白、桃熏、甜查理、法兰地、全明星、美香莎、妙香3号、妙香7号、白雪公主等10多个品种；我基地培育的草莓苗均为脱毒根系，具有根系发达、生长健壮、抗病力强、盛果周期长等特点。所培育的草莓苗品种纯正可达95%以上，成活率和品种纯度达到98%以上，所供草莓苗质量优良，价格合理，同时具有结果早、产量高等特点。

定植前对定植大棚内土壤进行耕翻。小叶对称，叶色浓绿叶柄粗，叶片大，长势健壮，丰产性好的幼苗进行定植。定植后喷施新高脂膜，缩短缓苗期。

开花至果实膨大控制在60%为宜。为防止高温高湿发病，喷洒新高脂膜800倍液。到翌年4月份，气温明显回升可拆除大棚两边的围膜，加大通风量，起到降温降湿作用，延长果实的生产期。

根据草莓生长情况及时补充磷钾肥及多元微量元素。整个生长过程中要有充足的水分，开花期土壤水分可稍干些，在草莓生长旺盛期和浆果膨大期需水较多。灌水可结合施肥进行，第二年开春后随着气温回升，生产速度加快，为避免草莓果实酸化，应增施钾肥。另外，在开花前、幼果期、果实膨大期喷施菜果壮蒂灵+0.3%-0.5%尿素+0.3%磷酸二氢钾液，补充果实生长所需养分，提高草莓品质。主要病虫害有蚜虫、蛇眼病、灰霉病、炭疽病及芽枯病等。应喷施多种针对性药物+新高脂膜进行防治。

定植前对根系进行药物处理，能促进生根和生长。常用5-10ppm的萘乙酸或萘乙酸钠浸根2-6小时，可促进生长，增加产量，效果显著。定植前剪除秧苗部分老叶和黑色老根，以减少叶面积，减少植株水分蒸

腾，并可促使抽发新根。

阴雨天栽植能避免阳光曝晒，因空气湿度大，叶片蒸发量小，能加快缓苗，提高成活率。但雨水过多或遇暴雨，应及时排水，防止水淹、淤心或受涝死亡。晴天栽植可在早晨或傍晚。

(栽后如遇晴天烈日，在补充水分的同时，可采用遮荫措施，如用苇帘、塑料纱、带叶的细枝条覆盖;有条件的可以采用塑料遮阳网、绿色或银灰色塑料薄膜扣置成临时小棚。但成活缓苗后，要及时晾苗，注意通风，以免突然撤除遮荫物时灼伤幼苗，3-4天方可撤棚。秧苗定植后立即浇透水。为保持土壤湿润并起降温作用，定植后3天内每天灌1次小水，经4-5天后改为2-3天灌1次小水，但也要防止过湿，造成通气不良，影响根系呼吸，导致沤根、烂苗，影响秧苗成活和生长。定植成活后可适当晾苗。但刚成活的幼苗仍不耐干旱，还要注意适时浇水，促进生长。