

北美冬青和相思豆的区别 北美冬青 陌上源林

产品名称	北美冬青和相思豆的区别 北美冬青 陌上源林
公司名称	山东陌上源林生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东东平现代农业科教产业园
联系电话	13053891999

产品详情

北美冬青现在看来大部分还是用来做鲜切枝，通过修剪手段可以生产出适合的鲜切枝条，通常在前一年进行重剪回缩，北美冬青温室的扦插方法，待第二年由基部抽生出枝条，通过促进营养生长使枝条达到一定长度，注意对小枝及弯曲等不合格枝条进行及时的修剪，第三年开始注意促进其生殖生长，5、6月份长度达到要求的枝条就开始开花坐果。待到果色转红后的11月份左右就可以进行采剪。

北美冬青繁殖技术

播种繁殖 在浆果11月红透成熟后，即可採种。北美冬青种子休眠期长，播种后要历经两个冬季才能萌芽生长。为方便管理，将种子沙藏一年，到第二年的冬季播种。播种前，将地深翻，北美冬青和相思豆的区别，清除地上杂草、秸秆等物并焚烧，以彻底清除草根及草种。然后作成畦宽1.2m，平整后将种子均匀撒播，北美冬青的移植时间，用疏松基质覆盖种子。

新枝萌发、顶叶长成后，北美冬青，可剪枝。枝长2~3cm，带一芽一叶。生根促进剂可用1000mg每升的NAA浸2s。春可用72孔穴盘，而夏、秋梢的叶片小，可选用105孔穴盘。基质选用透气性好的松磷+草炭+珍珠岩=5+4+1配制，生根期间注意喷雾降温，小拱棚内温度控制在35℃以下，拱棚内空气相对湿度在90%以上。25~30d后萌发新根，成苗期约需3个月，成苗率为50.5%。插枝易腐烂、叶片易失水脱落，这是成苗率较低的主要原因。因此，管理时要注意适当控制基质湿度和增加棚内空气相对湿度，以提高成苗率。

众所周知，北美冬青除了可以在室外装点园林外，还可做室内盆景花，但盆花的前期栽培在相对适宜的环境下可以直接在露地进行地栽，通常地栽的植株要比盆栽的生长速度快、生长质量好，可直接使用原土栽培，以保水透气肥力好的中性壤土为佳，加入泥炭、有机肥及粗砂进行改土后效果更好。四季可进行上盆销售，通常挂红果后在年宵前起挖上盆。上盆后浇一次透水，其后见干见湿。

北美冬青和相思豆的区别-北美冬青-陌上源林由山东陌上源林生物科技有限公司提供。山东陌上源林生物科技有限公司（www.sdmsyl.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。陌上源林——您可信赖的朋友，公司地址：山东东平现代农业科教产业园，联系人：郑经理。