

苏州亚新医疗用品 鹤壁一次性使用引流管

产品名称	苏州亚新医疗用品 鹤壁一次性使用引流管
公司名称	苏州市亚新医疗用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇钟塔路12号
联系电话	15995933777

产品详情

（三）指导要点。

- 1.告知患者心包、纵膈引流的目的、配合方法。
- 2.告知患者更换体位时防止引流管意外脱出或打折、受压等措施。

（四）注意事项。

- 1.术后当日每30~60min挤压引流管1次，若引流液多或有血块则按需正确挤压，防止堵塞；如接有负压装置，吸引压力一般1.5~2.0kPa。
- 2.手术当日2~3h引流管内出现大量鲜红色的血性液体，如成人 $>300\text{ml/h}$ ，小儿 $>4\text{ml}\times\text{体重}(\text{kg})/\text{h}$ ，且无减少趋势，及时通知医生。
- 3.引流量偏多，以后突然减少或引流不畅，患者血压下降、心率增快、呼吸困难、紫绀、面色苍白、出汗等症状，考虑心包填塞的可能，应及时通知医生。
- 4.发现引流出大量血性液或引流管被较多的血块堵塞，应立即通知医生。
- 5.患者下床活动时，须将引流管夹闭，以防导管脱落、漏气或液体返流。
- 6.拔管后观察患者有无胸闷、憋气、心悸，伤口渗液及出血，有异常及时通知医生。

三、“T”管引流的护理

（一）评估和观察要点。

- 1.评估患者的病情、生命体征及腹部体征，如有无发热、腹痛、等。
- 2.评估患者的皮肤、巩膜黄染消退情况及大便颜色；“T”管周围皮肤有无胆汁侵蚀。
- 3.观察引流液的颜色、性质和量。

（二）操作要点。

- 1.引流管用胶布“S”形固定，标识清楚。
- 2.引流袋位置必须低于切口平面。
- 3.保持引流通畅，避免打折成角、扭曲、受压。
- 4.“T”管周围皮肤有胆汁渗漏时，可用氧化锌软膏保护。
- 5.观察胆汁颜色、性质，一次性使用引流管，并准确记录24h引流量。
- 6.定时更换引流袋。

操作要点2

- 3.定时挤压引流管，引流液多或有血块则按需正确挤压，捏紧引流管的远端，向胸腔的方向挤压，再缓慢松开捏紧的引流管，防止引流瓶中液体倒吸；如接有负压装置，吸引压力适宜，过大的负压引起胸腔内出血及患者疼痛。
- 4.根据病情尽可能采取半卧位。
- 5.引流装置应保持密闭和无菌，保持胸壁引流口处的敷料清洁干燥，敷料渗出液较多应及时通知医生更换。
- 6.根据病情需要定时准确记录引流量。
- 7.引流瓶内无菌生理盐水每天更换，引流瓶每周更换，床旁备血管钳，更换时必须夹闭引流管，防止空气进入胸膜腔引起气胸。

苏州亚新医疗用品-鹤壁一次性使用引流管由苏州市亚新医疗用品有限公司提供。苏州市亚新医疗用品有限公司（www.yx-yiliao.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！