

周口吉塞拉 肥城于臣苗木 吉塞拉价格

产品名称	周口吉塞拉 肥城于臣苗木 吉塞拉价格
公司名称	肥城市于臣苗木种植专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市肥城市桃园镇驻地
联系电话	18854851168

产品详情

矮化型树：其砧木或中间砧是利用具有矮化特性的砧木嫁接繁殖而成，周口吉塞拉，其树体矮小，生长势中庸，树高和冠径一般在3~5米，进入结果期较早，正常管理条件下，2~3年开始结果，4~5年进入盛果期。矮化树对修剪反应不太敏感，剪后中短枝多、长枝少。轻剪缓放的枝条越多，树体衰弱越快，如果整体上发生严重衰弱时，其更新复壮要比乔化树难得多。

施肥量：以有机肥为主。以斤果斤肥或一斤果二斤肥计算。施入有机肥的量，成龄树亩施腐熟有机肥4000斤以上，幼龄树000~3000斤每亩。化肥可施三元复合肥、或尿素、过磷酸钙、硫酸钾复混肥，氮、磷、钾、比例、18:10：10或15:15:15。成龄树：1~2斤每株，每亩用量80~100公斤，幼龄树0.5~1斤每株，每亩50~70公斤。中微量元素肥，成龄树每亩施中微量元素肥沃田钾50斤，或其它中微量元素肥。树干涂白：樱桃树落叶至封冻前进行树干涂白，涂白剂配方：生石灰10公斤、石硫合剂原液1公斤、水40公斤；或生石灰5公斤、1.5公斤、食油0.2公斤、水40公斤，两种配方任选一种。浓度以涂刷在树干不往下流，也不起团为宜，在树干及大侧枝上均匀涂刷。

新品种大樱桃苗出现了

大樱桃新品种有许多，就连今年也是，这也开启了樱桃苗的新的契机，或许之前有的通过小编的文章也了解过樱桃苗的特征，吉塞拉哪家好，那么新出了这几个品种您都知道吗？

齐早大樱桃苗在山东泰安地区3月末开花、花期7到10天，自花结实；成熟期在5月上旬，比早大果早熟6到7天，果实发育期为35天左右，成熟期集中，吉塞拉价格，果实个头均匀，采收期短，需冷量低，在11月份落叶，年营养生长期200天左右。

鲁樱3号大樱桃苗成熟期是5月下旬，在山东泰安地区4月初开花，花期7到10天左右，属于异花授粉，可搭配萨米脱、拉宾斯、先锋等品种进行授粉；果实发育期45天左右，成熟期集中，采收期短，需冷量低，在11月份落叶，年营养生长期220天左右。

U2-7大樱桃苗在山东泰安地区4月初开花，花期7到10天，属于异花授粉，可搭配先锋、拉宾斯等品种进行授粉；在5月下旬成熟，果实的成熟期集中，采收期短，需冷量低，在11月份落叶，年营养生长期220天左右。

在每年的初春，偶尔会遇到天气降雨的情况发生。樱桃成熟阶段，吉塞拉报价，如果突然遭遇雨水或灌溉大水，导致土壤水分急剧变化，就会通过根系运送到果实内部，导致果肉迅速膨大，而果皮的生长速度跟不上果肉膨大速度，就会造成裂果发生。所以需要尽量避免在膨果期给果树浇大水。如果是大棚樱桃，遇到多雨或多云天气，棚内湿度增加，突然通风也会造成果实开裂。从管理上如何避免雨水对吉塞拉产量的影响呢？樱桃从开花到成熟期只有40-60天的时间，由于时间较短，所以施肥相对比较集中，在樱桃开花前到采果期间7-10天时间，选择喷施硼钙叶面肥，在膨果期选择施用与磷酸二氢钾一起使用或者选择高磷高钾的水溶肥配合使用，这样可以减少樱桃裂果的发生，还能提高樱桃的含糖量，提高品相。雨水天气为什么会造成吉塞拉的裂果呢？吉塞拉裂果一般存在的三个原因：一个是品种问题，有些品种本身就是容易裂果，比如美早等；二是营养不足，缺乏相应的中微量元素，比如硼钙钾元素，钙肥补充充足可以减少裂果的发生，硼肥钾肥可以增加樱桃的甜度；三是湿度问题，樱桃在成长阶段，水分突然加大极易造成裂果的发生。

周口吉塞拉-肥城于臣苗木-吉塞拉价格由肥城市于臣苗木种植专业合作社提供。周口吉塞拉-肥城于臣苗木-吉塞拉价格是肥城市于臣苗木种植专业合作社（www.dyjyxs.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：于经理。