

负压器 亚新医疗用品

产品名称	负压器 亚新医疗用品
公司名称	苏州市亚新医疗用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇钟塔路12号
联系电话	15995933777

产品详情

七、心包、纵隔引流的护理

（一）评估和观察要点。

- 1.评估患者意识状态、生命体征及病情变化。
- 2.观察引流液的颜色、性质、量。
- 3.观察长玻璃管内水柱波动，正常为4~6cm。

（二）操作要点。

- 1.连接吸引装置，使用前检查吸引装置的密闭性能，保持连接处紧密，防止滑脱。
- 2.保持引流管通畅，防止堵管，避免受压、扭曲或打折。
- 3.引流瓶低于胸壁引流口平面60~100cm，水封瓶长玻璃管没入水中3~4cm。
- 4.保持管道密闭无菌，防止逆行。
- 5.患者清醒后可抬高床头15°，循环稳定后取半卧位。
- 6.记录单位时间内引流量及24h累积引流量。
- 7.引流装置定时更换，保持胸壁引流口处的敷料清洁干燥，有外渗及时通知医生更换。
- 8.床旁备血管钳。

（三）指导要点。

- 1.告知患者心包、纵膈引流的目的、配合方法。
- 2.告知患者更换体位时防止引流管意外脱出或打折、受压等措施。

（四）注意事项。

- 1.术后当日每30～60min挤压引流管1次，若引流液多或有血块则按需正确挤压，防止堵塞；如接有负压装置，吸引压力一般1.5～2.0kPa。
- 2.手术当日2～3h引流管内出现大量鲜红色的血性液体，如成人>300ml/h，小儿>4ml×体重(kg)/h，且无减少趋势，及时通知医生。
- 3.引流量偏多，以后突然减少或引流不畅，患者血压下降、心率增快、呼吸困难、紫绀、面色苍白、出汗等症状，考虑心包填塞的可能，应及时通知医生。
- 4.发现引流出大量血性液或引流管被较多的血块堵塞，应立即通知医生。
- 5.患者下床活动时，须将引流管夹闭，以防导管脱落、漏气或液体返流。
- 6.拔管后观察患者有无胸闷、憋气、心悸，伤口渗液及出血，有异常及时通知医生。

注意事项3

（7）术后、外伤性断裂：应持续冲洗2至3天，术后早期注意冲洗速度，过快可使创面大出血，过慢内出血凝固易形成血块使引流不畅。引流液鲜红时应加快滴速，及时冲出血液，同时观察血压变化。如有血块或组织碎片阻塞管道时，可用手指挤压管子，如仍不通畅加用一定压力冲洗，使血块冲碎而排出。膀胱手术者每次注入量不宜超过50ml，负压器，冲洗液注入后，应全部抽出后再注入，反复冲洗。

负压器-亚新医疗用品(图)由苏州市亚新医疗用品有限公司提供。苏州市亚新医疗用品有限公司(www.yx-yiliao.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亚新医疗——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市吴中区木渎镇钟塔路12号，联系人：王经理。