

胸瓶引流瓶 亚新医疗

产品名称	胸瓶引流瓶 亚新医疗
公司名称	苏州市亚新医疗用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇钟塔路12号
联系电话	15995933777

产品详情

注意事项

- 1, 严格无菌操作, 保持引流袋位置低于引流部位, 引流袋可1周更换1 - 2次 (引流液有性状, 颜色改变的需每日更换)。
- 2, 保持引流管通畅, 定时挤压, 避免引流管折叠, 扭曲。
- 3, 观察引流液的量, 性状, 色泽变化, 胸瓶引流瓶, 与病情是否相符, 每日记录, 发现异常, 及时与医生联系。
- 4, 引流管妥善固定, 以防滑脱, 活动时勿将引流管拉脱。
- 5, 负压引流瓶更换方法相同。

三、“T”管引流的护理

(一) 评估和观察要点。

- 1.评估患者的病情、生命体征及腹部体征, 如有无发热、腹痛、等。
- 2.评估患者的皮肤、巩膜黄染消退情况及大便颜色; “T”管周围皮肤有无胆汁侵蚀。
- 3.观察引流液的颜色、性质和量。

(二) 操作要点。

- 1.引流管用胶布“S”形固定，标识清楚。
- 2.引流袋位置必须低于切口平面。
- 3.保持引流通畅，避免打折成角、扭曲、受压。
- 4.“T”管周围皮肤有胆汁渗漏时，可用氧化锌软膏保护。
- 5.观察胆汁颜色、性质，并准确记录24h引流量。
- 6.定时更换引流袋。

（二）操作要点。

- 1.协助患者取舒适卧位，清洁鼻腔，测量插管长度（从鼻尖经耳垂至胸骨剑突处的距离）。
- 2.润滑胃管前端，沿一侧鼻孔轻轻插入，到咽喉部（插入14~15cm）时，嘱患者做吞咽动作，随后迅速将胃管插入。
- 3.证实胃管在胃内后，固定，并做好标记。
- 4.正确连接负压吸引装置，负压吸力不可过强，以免堵塞管口和损伤胃黏膜。
- 5.保持胃管通畅，定时回抽胃液或向胃管内注入10~20ml生理盐水冲管。
- 6.固定管路，防止牵拉，并保证管路通畅。
- 7.记录24h引流量。
- 8.口服给药时，先将药片碾碎溶解后注入，并用温水冲洗胃管，夹管30min。
- 9.给予口腔护理。
- 10.必要时雾化吸入，保持呼吸道的湿润及通畅。
- 11.定时更换引流装置。
- 12.拔管时，先将吸引装置与胃管分离，捏紧胃管末端，嘱患者吸气并屏气，迅速拔出。

胸瓶引流瓶-亚新医疗(推荐商家)由苏州市亚新医疗用品有限公司提供。苏州市亚新医疗用品有限公司(www.yx-yiliao.com)为客户提供“医疗器械,塑料制品”等业务,公司拥有“亚新医疗”等品牌,专注于医疗器械等行业。欢迎来电垂询,联系人:王经理。