

火焰南天竹街道绿化苗木 火焰南天竹 金枫绿化

产品名称	火焰南天竹街道绿化苗木 火焰南天竹 金枫绿化
公司名称	泰安金枫园林绿化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安肥城市孙伯镇
联系电话	15066724999 15066724999

产品详情

南天竹怎样施肥

接下来，我们就一起看一下南天竹到底应该怎么施肥吧！

- 1.施肥的时间。一般是从2月份开始，每个月都要施一至两次的肥料，到7月份就可以停止了。
- 2.肥料的选择。平时可以多施磷、钾肥，或者是饼肥和骨粉换着施加，但是浓度不能太大，火焰南天竹图片，到五月底的时候可以喷一次磷酸二氢钾。五月至九月期间，可以没过十五天至二十天的时间就施一次稀的薄饼水，大概没过两个月就要施一次浓度大约0.2%的liu酸亚铁水。
- 3.施肥方法。在南天竹的幼苗期液肥要淡一些不能太浓，一般液肥和水的比例是1:10，在南天竹的生长期，可以每个月施一至两次的液肥，火焰南天竹街道绿化苗木，这个时候的比例可以稍微浓一些了，液肥和水的比例是1:8，成年之后需要每年施一次干肥，分别在每年的5月份、八月份以及十月份进行，第三次施肥的时间应该选择在把它搬进室内越冬的时候进行，此时的肥料可以用饼肥或者是麻酱渣。在雨季的时候只能施干肥，而且每个月只能施一次，每盆约20~40克。
- 4.肥料的用量。肥量的用量一般在di一次和第二次要少一些，第三次开始就需要适当的施肥的量了。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安金枫园林绿化有限公司

火焰南天竹

火焰南天竹为常绿小灌木，高30~40 cm。二回三出复叶，偶尔有羽状复叶，小叶卵形、长卵形或卵状长椭圆形。小叶长4~5 cm，宽1.5~2 cm。叶薄革质，先端渐尖，基部楔形，全缘，两面无毛。幼叶为暗红色，后变绿色或带红晕。入冬成红色，红叶经冬不凋。总叶柄较短，中间的叶柄长于两边的小叶柄。节间特短，仅为0.1~0.5 cm，只有普通南天竹的1/10。枝叶紧密，火焰南天竹，株型矮小。观叶为主，不见开花。

火焰南天竹萌芽始于4月中旬，平均温度15℃时发叶，先长出整片小叶，幼小的叶片再逐步长大成完整叶片。有时会由于气候和空气质量的影响，出现狭长皱折叶片，持续到7月上旬，到盛夏高温期停止伸长。9~11月又一新的生长高峰，11月下旬~12月上旬停止伸长。一般枝条年生长量10.15cm，如果肥水条件好，可以长到20.25cm。火焰南天竹的节间短，5cm内有10节左右。12月中下旬气温在5℃以下，持续1周叶片变红，以后随着低温的持续，逐渐变成红色，红色可持续到第二年3月份。

火焰南天竹喜光；喜温暖湿润的气候；对土壤要求不严；喜欢疏松排水的土壤中生长，在干旱瘠薄的土壤中生长缓慢。

火焰南天竹的栽培管理：

小苗的移植一般在4~5月份为宜。移植前，土壤要翻耕，施用有机肥或复合肥做基础肥，有机肥2 kg/m²，复合肥0.5 kg/m²；大苗移植时，带宿土，春天进行时修剪掉1~3的叶片，非正常季节要带土球和剪叶更多。种后及时浇透水，如遇强阳光要遮阴处理3~5 d。保持土壤湿润10 d以上。

12~3月使用有机肥，4~5月每半月1次2%的尿素液肥使用。9~10月使用复合肥100 g/m²，混入土内，浇水。12月不宜追肥。枝叶的革质和黄连素的成分，火焰南天竹什么时候变红，具有天然的抗病虫能力。

萧条的冬季，一抹艳丽的红色夺人眼球，不只让人立刻记住了它的“容貌”，也感受到其传递出来的融融暖意，它就是火焰南天竹。

火焰南天竹属常绿小灌木，高30cm-40cm，二至三回羽状复叶，互生，小叶薄革质，卵形、长卵形或卵状长椭圆形。叶长4cm-5cm.宽1.5cm-2cm.枝叶紧密，株型矮小。花期5-7月，圆锥花序顶生，花小而白，散发沁人的香味。

火焰南天竹生长势在冬季表现更为出色，株型更为丰满，且叶片和果实呈红色也更为浓重，十分醒目。

泰安金枫每年出圃火焰南天竹扦插苗50万棵，红冠红枫扦插苗20万棵，火焰卫矛扦插苗20万棵，扦插苗也可以接受预定，泰安金枫欢迎新老朋友前来参观订货。

火焰南天竹街道绿化苗木-火焰南天竹-金枫绿化(查看)由泰安金枫园林绿化有限公司提供。泰安金枫园林绿化有限公司(www.tsjflh.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。金枫绿化—您可信赖的朋友,公司地址:泰安肥城市孙伯镇,联系人:王经理。同时本公司(www.meiguohongfeng8.com)还是从事红点红枫价格,2-8公分美国红枫基地,美国红点红枫供货商的厂家,欢迎来电咨询。