

金纹细蛾诱剂价格 “ 本信息长期有效 ”

产品名称	金纹细蛾诱剂价格 “ 本信息长期有效 ”
公司名称	北京中捷四方生物科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区马驹桥联东U谷西区二号院59A
联系电话	18510121801

产品详情

杨树透翅蛾防治方法

1. 选择抗虫树种 如有些杂交杨树对白杨透翅蛾有较强的抗性。
2. 加强检疫在引进或输出苗木时，严格检验，发现虫瘿要剪下烧毁，以杜绝虫源。
3. 人工防治幼虫初蛀入时，发现有蛀屑或小瘤，要及时剪除或削掉，或向虫瘿的排粪处钩、刺杀幼虫。秋后修剪时将虫瘿剪下烧毁。
4. 药剂防治在幼虫侵入枝干后，表面有明显排泄物时，可用50%磷胺乳油加水20~30倍液涂1环状药带，或滴、注蛀孔，药杀幼虫。用三硫化碳棉球塞蛀孔，孔外堵塞黏泥，能sha死潜至隧道深处的幼虫。幼虫初侵入期往受害的干、枝上涂抹yoiqing菊zhi泥浆（2.5%youqing菊酯乳油1份，黄黏土5~10份，加适量水合成泥浆）du杀初孵化的幼虫。抓住初孵幼虫尚未钻入树干的有利时机，在树干枝干上喷洒1：500~1000倍的didi畏液，每9天喷1次，毒sha效果良好。

以上是由北京中捷四方生物科技股份有限公司发表内容，如有需要，欢迎拨打图片上的热线电话！

松墨天牛的形态特征

松墨天牛，*Monochamus alternatus* Hope，天牛科墨天牛属的一种昆虫。是我国松树的重要蛀干害虫，也是松树的毁灭性害松材线虫病(*Bursaphelenchus xylophilus*)的主要媒介昆虫。在松材线虫的扩散和侵染的过程中，松墨天牛起着携带、传播和协助病原侵入寄主的关键性作用。体长10~30mm，宽4.5~9.5mm，橙黄色至赤褐色。鞘翅有特殊斑纹，与其他种容易区别。头部额区刻点细密，头顶处较粗糙并略有zhou纹。口器为下口式，侧观其额面与体轴近似垂直。触角棕褐色，第三节比柄节长约一倍，并略长于第四节，

柄节上具封闭式端疤。雄虫一、二节全部及第三节基半部，具稀疏的灰白色绒毛，触角全长超过体长的1.5倍。雌虫除末端一、二节外，其余各节除端处留有深色环以外，均具稀疏的灰白色绒毛，触角长度近似于体长或仅超过体长的1/3。前胸宽胜于长，刻点粗糙多皱wen，中瘤不显著，两侧具一对较大的刺突，其端处稍呈圆锥形。前胸背板上有二条明显的橙黄色纵带，被三条黑褐色纵带间隔开。前足基节窝为封闭式，中足胫节处侧缘端处具一斜沟。小盾片上密被橙黄色绒毛。翅基部有颗粒状突起和粗大的刻点，呈半规则排列，翅面上具方形或长方形黑色、褐锈色及灰白色绒毛，组成大小不等的斑块，金纹细蛾诱剂价格，镶嵌成不规则的五条纵纹。翅端部较狭窄近似刀切状，内端角明显，外端角呈大圆弧形。后翅发达有较强的飞翔能力。腹部的腹面及足杂有灰白色绒毛。

中捷四方生物科技有限公司主营昆虫信息素除虫产品，粘虫板，如需了解更多详情，欢迎与我们交流!

桃潜叶蛾危害

作物危害桃、杏、李、樱桃、苹果、梨等。折叠编辑本段发生消长规律每年发生约7代，以成虫在桃园附近的梨树、杨树等树皮内，以及杂草、落叶、石块下越冬。第2年桃树展叶后成虫yu化，产卵于叶表皮内。老熟幼虫在叶内吐丝结白色薄茧化蛹。5月上旬发生代成虫，以后每月发生1次，后I代发生在11月上旬。折叠编辑本段防治方法(1)农业防治。冬季结合清园，扫除落叶烧毁。

(2)药剂防治。成虫发生期喷药，常用药剂有50%杀螟松乳剂1000倍液，功夫乳油3000倍液。

中捷四方生物科技有限公司主营蛾诱剂，如需了解更多详情，欢迎与我们交流!

金纹细蛾诱剂价格“本信息长期有效”由北京中捷四方生物科技股份有限公司提供。“昆虫信息素除虫产品,粘虫板”就选北京中捷四方生物科技股份有限公司(www.bjzjsf.com)，公司位于：北京市通州区马驹桥联东U谷西区二号院59A，多年来，中捷四方坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中捷四方期待成为您的长期合作伙伴！