

鸡西吉塞拉大樱桃 矮化吉塞拉大樱桃苗 超顺苗木

产品名称	鸡西吉塞拉大樱桃 矮化吉塞拉大樱桃苗 超顺苗木
公司名称	泰安超顺苗木专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区马庄镇北苏村
联系电话	13953803397

产品详情

吉塞拉樱桃苗要定期管理：

樱桃树苗具体定植可于秋冬季（10月下旬——12月上旬）或春季（2月—4月）进行。樱桃树苗栽植以秋冬季为宜，樱桃树苗栽植多采用株行距3米×4米的规格。栽前先挖长宽深各80厘米的定根坑，挖坑时，要求表土（熟土）、心土（生土）分开堆放，每坑用5千克腐熟的鸡猪粪便、2.5千克尿素和熟土混合均匀，把混合均匀的部分熟土回填定植坑内至40厘米，把树苗放入定植坑中央、扶正，将剩余熟土和生土依先后顺序依次回填坑内。一边回填，一边用手轻提、抖动树苗，使树苗根系舒展，细土进入根系中间，和根系完全充分接触紧密，边填边踩，直至土面超过树苗原先土印痕迹2-5厘米，不宜过深。定植后，浇一次定植水，要求浇足浇透，待水完全下沉后，矮化吉塞拉大樱桃苗，树盘表面撒一层干土，鸡西吉塞拉大樱桃，用地膜覆盖保墒提温。栽后至第二年四月期间，根据天气情况可浇一到二次透水，浇水可在地膜下或行间进行。待到第二年四月份气温回升后，去掉地膜，换用杂草对树盘覆盖。

樱桃采果后的注意事项：

疏枝：采果后及时将过高、过密的背上枝及部分过密的结果枝组疏除，打开内膛。将临时结果枝、下垂枝、细弱枝以及外围过密枝疏除，轮生枝上留2-3个枝其余的疏除，打开外围，使得枝条外稀内密，均匀分布，吉塞拉大樱桃育苗，通风透光良好。

对于肥水充足，以上手法仍不能抑制其新梢生长时，可在6月初喷200倍15%多效唑1次，大约1周后再喷1次300倍液，可明显抑制其营养生长，促进花芽分化。

抹芽：将因疏枝、回缩、摘心后萌发的新芽没有空间的及时抹除。

摘心：前期保留下来的内膛枝继续摘心，回缩后萌发的新梢如有空间可留5-15厘米反复摘心，培养小型结果枝组，外围新梢长到40厘米左右时留25厘米短截。

回缩：对形成光腿的结果枝应一律回缩到叶芽处，控制结果部位外移。

樱桃采果后注意苗木的后期工作，为下一季的收获大好稳定的基础。

吉塞拉樱桃苗流胶病的防御：

吉塞拉樱桃苗流胶病的防御 流胶病在大樱桃产区是一种极为普遍的危害，发病原因不明，轻则影响树体生长和结果质量，重则引起树体，对吉塞拉樱桃苗的危害极大。因为其原因无法查证，所以到现在为止，没有根本的方法，只能依靠平时的科学防护和治理。

1. 合理建园，改良土壤。大樱桃适宜在砂质壤土和壤土上栽培，加强土、肥、水管理，提高土壤肥力，吉塞拉大樱桃介绍，增强树势，不在土壤黏重、通气不良和排水不便的地方建园。
2. 合理修剪。一次疏枝不可过多，对大枝也不宜疏除，避免造成较大的剪锯口伤，避免流胶或干裂，削弱树势。树形紊乱，非疏除不可时，也要分年度逐步疏除大枝，掌握适时适量为好。
3. 加强土壤管理。樱桃树不耐涝，雨季防涝，及时中耕松土，改善土壤通气条件。
4. 枝干涂白。冬春季树干、大枝涂白，防日灼、冻害。涂白剂配制方法：生石灰6公斤，氯化钠1—1.5公斤，大豆汁0.3公斤，水20公斤。先把生石灰用水化解开，再加入大豆汁和氯化钠，搅拌成糊即可。

三、药剂防治

1. 芽膨大前，喷洒石硫合剂加80%，200-300倍液，铲除越冬病菌。
2. 刮斑。在樱桃休眠期首先进行刮胶和除掉腐烂树皮，尽量减少机械损伤，然后用波美3-5度石硫合剂或40%，50-100倍液，连续3次涂抹病斑，对病斑防效可达70%-85%，效果比较明显。
3. 对病斑包上黏黄泥也有一定防治效果，但没有石硫合剂效果明显。

鸡西吉塞拉大樱桃-矮化吉塞拉大樱桃苗-超顺苗木(诚信商家)由泰安超顺苗木专业合作社提供。“梨树苗，李子苗，桃苗，苹果苗，葡萄苗”就选泰安超顺苗木专业合作社（www.tachaoshun.com），公司位于：泰安市岱岳区马庄镇北苏村，多年来，超顺苗木坚持为客户提供好的服务，联系人：苏经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。超顺苗木期待成为您的长期合作伙伴！