

高杆红叶石楠 采购高杆红叶石楠小苗 大地苗圃基地

产品名称	高杆红叶石楠 采购高杆红叶石楠小苗 大地苗圃基地
公司名称	金华市大地苗圃基地
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市苏孟乡
联系电话	13819983978

产品详情

金华市大地苗圃基地批发出售红叶石楠，红花继木，金森女贞，精品桂花等系列品种。

桂花有金桂，银桂，丹桂，四季桂，福建丹桂，4公分高杆红叶石楠批发，状元红；

红叶石楠小苗有，大杯，小杯，地摘苗，石楠球，高杆石楠；

金森女贞有小杯，大杯，高杆红叶石楠，地摘苗，金贞球，

大乔木有 香樟树，无患子，栾树，采购高杆红叶石楠小苗，乌桕，杜英，高杆女贞，鹅掌楸；

红花继木有球，大杯，小杯地摘等产品。

金华市大地苗圃基地为您介绍：茶花虫害防治技术-----黑刺粉虱

1、危害状况 黑刺粉虱主要危害茶花叶片，吸取叶片的汁液，其分泌物可导致烟煤病大量发生，严重影响茶花的正常光合作用，造成大量落花等现象。

2、防治方法 在冬季或早春，把有虫枝、叶剪除，并集中烧毁，以除虫源。 在若虫孵化盛期，可25%胺硫磷、50%马拉松800~1000倍液喷洒；或用50%二臭磷、50%杀螟松1000倍液喷洒；或用扑虱灵1000倍液喷洒，7天喷1次，效果良好。

金华市大地苗圃基地为您介绍：桃红颈天牛防治方法

桃红颈天牛：主要寄居在桃、杏、李、梅、樱桃、苹果、梨等植物上面。
成虫体长28-37mm，体黑色发亮，前胸棕红色或黑色，密布横皱，两侧各有刺突1个，背面有瘤突4个，黯翅表面光滑。卵卵圆形，白色，长6-7mm。幼虫老熟体长42-52mm，乳白色，长条形；前胸宽，背板前半部横列黄褐斑4块；体侧密生黄细毛，黄褐斑块略呈三角形；各节有横皱。蛹为裸蛹型，长约35mm，乳白色，后黄褐色。

防治方法：

- 1.重点放在消灭成虫上，在成虫期人工捕杀效果佳，尤其中午成虫有从树冠下到干基部栖息的习性。
- 2.在成虫产卵前期进行树干及主枝涂刷白涂剂(生石灰10份、硫磺1份、水40份)或石灰水，防止产卵。

金华市大地苗圃基地为您介绍：红叶石楠栽培方法

选好圃地-----应选水源较好而地势较高的轻粘壤土或沙壤土作圃地，坚持轮作制，不在同一块圃地连续培育同一种红叶石楠。育苗时，苗圃土壤要事先消毒，主要方法有以下4种：

- 1、多菌灵消毒：用50%的可湿性粉末，高杆红叶石楠小苗价格，每平方米拌1.5克。也可按1：20的比例配制成药土撒在苗床上，均能有效防治苗期病害；
- 2、防腐剂消毒：每平方米苗圃用防腐剂50毫升加水10公斤均匀喷洒地表，然后用塑料薄膜或草袋覆盖，闷10天左右揭开覆盖物，使气体挥发，两天后可播种；
- 3、硫酸亚铁消毒：用3%的硫酸亚铁溶液处理土壤，每平方米用药液0.5公斤，可防治针叶花木的苗枯病，桃、梅的缩叶病，兼治花卉缺铁引起的黄化病。圃地最好冬季深翻，第二年播种时浅翻一次；
- 4、五氯硝基苯消毒：每平方米苗圃地用75%五氯硝基苯4克、代森锌5克，混合后再与12公斤细土拌匀，播种时下垫上盖，对立枯病、菌核病、猝倒病等有效果。

品种齐全，欢迎新老客户来电咨询！