

铁粒头板栗苗价格 铁粒头板栗苗品种怎么样

产品名称	铁粒头板栗苗价格 铁粒头板栗苗品种怎么样
公司名称	泰安市果之语农业科技有限公司
价格	3.00/棵
规格参数	品牌:果之语农业 板栗苗:嫁接板栗苗 产地:山东泰安
公司地址	泰安市高新区北集坡镇
联系电话	18364868333

产品详情

铁粒头板栗苗价格 铁粒头板栗苗品种怎么样 嫁接板栗苗批发：华丰板栗苗、华光板栗苗、红栗1号板栗苗、黄棚板栗苗、泰山薄壳板栗苗、实生板栗苗、一年板栗苗、两年板栗苗、嫁接板栗苗、板栗树苗、板栗树。免费提供板栗苗种植技术。苗圃基4动了周边农民发展苗木3200余亩,也衍生了农民苗木,极大地加了农民收入。淡季时,每扎月季切花的都在20元左右,即便是去年情人节,也只在50元左右,因为今年的上市数量,价格大幅度上涨,因此销售量比去年了3040%左右。与往年不同的是尽管网上订购的花束价格虽然比实体店高出10—15%,但电商依然明显抢了实体花店的生意。从事鲜花行业多年的周说,减产的鲜花运到北方来以后,很多又出现了情况,折损率非常高,这也在一定程度上加重了商家的成本。

双季板栗种植技术要点 一、建园密度株行距3×3米或3×4米,每亩56株或74株。

二、定植1、挖坑种植坑为宽60 - 80公分,深度60公分以上,方坑圆坑均可。2、基肥定植基肥为20 - 40公斤腐熟农家肥或肥,加入0.5 - 1斤钙镁磷肥,1斤花生麸(可用可不用)。如农家肥不足,可用5 - 10公斤农家肥 + 表层肥土 + 1斤生物肥 + 0.5斤钙镁磷肥 + 1斤花生麸(可用可不用)。3、定植定植前,用apt3号生根粉10万倍稀释液调制的泥浆水沾根,再定植。apt3号生根粉必须先用酒精溶解再与水混合。定植时,先将表土与肥料边混合边放入坑底约1/2,再盖上新土,在回填土达2/3时,可将钙镁磷肥与土边混合边回填。起果盘高度15 - 20公分。回填后,挖一小坑,将果苗种下,并将果苗根系整理整齐,不要向起,根系周围回填土必须细碎,以利于根系与土壤的接合,成活率。定植深度,以果苗原入土深度为宜。回填完毕,将苗向上提一提,再压实土壤,然后灌定根水。三、水板栗树根系发达,有菌根,比较抗旱,不耐涝,灌过2 - 3次定根水后,基本靠天雨,不是连续旱情,可以不淋水,但有水,则生长量及产量有较大。水的重要期为1、花前期,也就是4 - 5月份,此时好不要过早,否则对开花有影响。2、产果期,9 - 11月,此时缺水会落果和果实偏小。但此时适逢我区秋旱,可以使用“固体水”等保水剂抗旱和保水。是在树冠滴水线位置挖一环形沟,深30公分左右,将保水剂与细土混匀后施入沟中,然后浇足水,用土将沟填平,以干品计,每树施用量幼龄树20 - 30克,成年树30 - 40克。也可穴施,是在树干周围均匀打孔或挖穴,深度20 - 30公分,将保水剂与细土混匀后分散到每个孔或穴中,浇透水后覆土。四、土壤土壤越疏松,板栗根系生长越好,板栗树一年需松土2 - 3次,一般在夏、秋季,具体说是在次采果和第二次采果后,进行中耕松土锄草,结合施肥同时进行,松土深度20公分左右,范围为树冠左右20 - 30公分。五、肥1、一龄树定植出芽后,可用1000倍奥普尔进行叶面、地面喷施次肥。过20天加入0.3%尿素再喷一次。由于在4 - 6月份,板栗根系都还吃不到土壤中的基肥,在5 - 6月可撒施一次硫酸钾型复合肥,用量50 - 60克/株或生物肥100 - 120克。施复合肥后,须用细土将复合肥覆盖,以免复合肥蒸发***果

树，撒施位置为果树树冠滴水线向外20公分处。如需采收当年果实，需在7月份叶面喷施1 - 2次500倍硼砂水和广西化工院产的保果灵或产南风赤1000倍保花保果和提供打果所需微量元素。幼果期、果实期各施一次500倍奥普尔叶面肥。11月份采收完后的板栗，须施一道产后肥。沿果树树冠在树的东侧或南北侧开挖深50公分、宽20公分、长30公分坑，交杂草先填下坑再将5 - 8公斤腐熟农家肥加上250克生物肥与土边混边回填，后用300倍奥普尔稀释液每株5斤水泼入即可。

2、第二年树在4月份施一次花前肥，每株树地施200克生物肥，撒施同前。由于双季板栗为连续开花，连续挂果，对硼、锰、磷、钾、镁、钙的消耗也相应较大，因此，从4月份起，每2个月施一次叶面肥，肥的配比为：硼砂500倍 + 保果灵一支 + 奥普尔500倍。次采果和第二次采果后结合松土地施农家肥5公斤，生物肥250克2次。11月份采收完后的板栗，施一道产后肥。沿果树树冠在树的东侧或南北侧（上一年东西，今年南北）开挖深50公分、宽20公分坑，将杂草先填下坑再将10公斤腐熟农家肥加上500克生物肥与土边混边回填，后用300倍奥普尔稀释液每株5斤水泼入即可。

六、修剪同病虫害及缺素症

1、修剪一般幼树经三年左右时间可完成“自然开心形”或“主干疏层形”树形、投产后分生长期、休眠期进行。生长期：4 - 11月，春梢萌发后抹去萌蘖，春梢30厘米长摘心，选留2 - 3个分布均匀、方位、生长势强新梢，夏梢抽发后行摘心，充实的结果母枝和结果枝。休眠期：12月 - 次年3月前剪去病虫枝、密生枝、纤细枝、交叉枝等对弱枝采取多疏少留，对强树旺枝则多留少疏，徒长枝酌情剪留。对幼树、新梢中的直立枝强行拉枝，可缓和顶端优势，促进侧芽萌发及花芽分化，有利于早结丰产。成年树及高接树适当进行回缩，以促发新梢，成立体结果。疏花疏果：第二季果往往偏多偏小，可在8月中旬做疏花疏果，1个果枝保留2 - 5个雌花或幼果，将此后开花全部抹去，使两季结果平衡并大果型。