

北京吉塞拉大樱桃 吉塞拉大樱桃砧木好么 超顺苗木

产品名称	北京吉塞拉大樱桃 吉塞拉大樱桃砧木好么 超顺苗木
公司名称	泰安超顺苗木专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区马庄镇北苏村
联系电话	13953803397

产品详情

如何让吉塞拉大樱桃生长的好呢？

基苗床是植物生长的物质基础，除具备富含腐殖质、营养成分及土壤疏松通气、蓄水保肥的特性外，北京吉塞拉大樱桃，还必须无病虫害源。因此苗床及吉塞拉培养土要定期进行消毒灭菌。常用的苗床消毒法有高温消毒和药剂消毒两种。

高温消毒是通过提高苗床土壤温度进行杀毒。秋季是大棚育苗时机。为提高育苗质量，在育苗前，应选晴天进行苗床消毒。方法是深挖苗床，深度为15厘米~20厘米，晾晒2天~3天，如铺设黑色塑料地膜，则效果更佳，吉塞拉大樱桃树种植技术，可使苗床温度达到50 以上，进而消除土中的害虫、病菌孢子和线虫。

药剂消毒是使用消除土壤中的害虫及病原菌。按使用的种类和消毒方式的不同，大致分以下几种。

杀毒矾毒土法。每平方米用10克64%杀毒矾拌细土10公斤撒在苗床土壤中，半个月后再整地。

多菌灵毒土法。每平方米用50%多菌灵10克与干细土拌匀，在播种前将1/3药土撒在苗床上作垫土，将种子播在上面后，再将剩下的2/3药土作覆土。撒后在土壤表面适量洒水，保持土壤湿润，以免过干产生药害。

百虫毒土法。为防止种子出苗后遭受蝼蛄、蚯蚓等危害，在填营养土之前，每平方米苗床可用2.5%百虫粉4克~5克，加细土0.5公斤~1公斤拌匀后，撒入苗床消灭地下害虫。

强烈消毒法。苗床在翻土做床整地后，使用0.1%~0.5%高溶液喷洒浇透，用薄膜盖闷床土2天~3天，吉塞拉大樱桃砧木好么，揭膜后让苗床稍微晾干些再进行播种或扦插。此法能有效地消除床土中的病菌，防止立枯病、腐烂病等。

消毒法。在扦插或播种前15天，将苗床耕松，每平方米用50毫升兑水5公斤混匀后喷在苗床上，然后用

旧麻袋或薄膜盖4天~6天。也可将加水配成100倍液，每公斤液可混合4吨~5吨营养土，将营养土拌好，用膜严实封住，可消除土壤内的病菌。2天~3天后揭去膜，晾晒8天~10天，使土壤中的药散发后再填入苗床。

多菌灵溶液消毒法。将50%多菌灵配成1000倍液，按1000公斤营养土加50克~60克多菌灵的用量喷洒，喷后将其拌匀，用膜密封2天~3天，可消除土壤中的多种病菌。

敌消毒法。用95%200倍~400倍液直接喷洒苗床后进行扦插或播种。

吉塞拉大樱桃注水技术：

吉塞拉大樱桃是北方落叶果树中果实成熟较早的树种。吉塞拉大樱桃注水，要根据其生长发育的需要和天气情况进行。

一、花前水

开花前进行浇水。这一时期气温较低，注水量要小，以水过地皮干为度，以免影响根系生长。

适宜用水库、水塘的水浇灌。井水温度低，提上采先贮存在水池里，晒一段时间，或者让井水流经较长的渠道，经过增温后再浇灌。

二、催果水

谢花后至果实成熟前是有机大樱桃对水分敏感的时期。这一时期注水要勤，注水量要大，一般注水2-3次。

注水时要在有机大樱桃园的株行间筑成正方形或长方形的畦。树干附近土面要稍高，四周土面要整平，以防高处干旱、低处积水。

三、采后水

在水源充足的地方，采果后天气干旱时，可结合施肥进行注水，以充分发挥肥效，促进花芽分化。

冬季修剪吉塞拉大樱桃苗木的技术要领都有哪些：

吉塞拉大樱桃是非常备受大家欢迎的一种水果，能够吃到好看又美味的樱桃，功劳完全在于吉塞拉大樱桃苗圃的专业管理人员对樱桃苗的正确管理。

吉塞拉大樱桃苗木冬季修剪不宜进行的过早，一般在立春后再实施冬季修剪。确定中干高度，一般冬季修剪留的中干高度，具体高度应根据果园树体的长势来确定，长势好可高，吉塞拉大樱桃早衰视频，不好可低。修剪后，要使这一行的高度大体相等，有的短截的要轻，有的要重，因为一行树的长势是不一样的，冬季修剪中要予以适当进行修剪调节，使以后的树体基本一致。这一点，似乎与苹果、桃一样，而实质上是不同的，它对中干的修剪要比苹果重，处于控制状态，利于侧生枝的萌发，而苹果、桃主要是为了扶干，维持先端优势。对中干上的所有侧生枝进行极重短修剪即留撇短修剪。一定不要剪留地过长。也不要疏剪，以免造成伤口。在修剪口要及时涂抹愈伤防腐膜保护伤口组织愈合生长。

北京吉塞拉大樱桃-吉塞拉大樱桃砧木好么-超顺苗木(诚信商家)由泰安超顺苗木专业合作社提供。泰安超

顺苗木专业合作社（www.tachaoshun.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。
超顺苗木——您可信赖的朋友，公司地址：泰安市岱岳区马庄镇北苏村，联系人：苏经理。