

湖南2公分月季树 春诚月季3到10公分 湖南2公分月季树基地

产品名称	湖南2公分月季树 春诚月季3到10公分 湖南2公分月季树基地
公司名称	方城县春诚月季种植基地
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市方城县博望镇
联系电话	18736666576 18736666576

产品详情

月季主要的病害有哪些？怎么预防？

月季是很多花友喜欢养殖的一种花卉了，在生活中也是比较常见，它们总是安静地开放，给花友带来很多的欣喜。与娇艳的玫瑰以及清高的水仙相比，月季花可以说是非常直率了。它们开放的时候大大方方，香气四溢，让人们看到了也会特别开心。

现在喜欢月季花的朋友们可以说是非常多了，很多都在自己家的阳台上栽种几株。不过为了将盆栽的月季养好，朋友们还是要了解一些养护的技巧，只有这样才能将月季花养好。

养护月季花，要注意病害的预防和，大花月季的病害的预防主要有几下几种：真菌：

一、黑斑病：主要侵害叶片、叶柄和嫩梢，叶片初发病时，正面出现紫褐色至褐色小点，扩大后多为圆形或不定形的黑褐色病斑。可喷施多菌灵、托布津、达可宁等。

二、病：侵害嫩叶，两面出现白色粉状物，早期病状不明显，层出现3--5天后，叶片呈水渍状，渐失绿变黄，严在时则造成叶片脱落。发病期喷施多菌灵、三即可，但以国光英纳效果比较好。

三、叶枯病：多数叶尖或叶缘侵入，初为黄色小点，以后迅速向内扩展为不规则形大斑，严重受害的全叶枯达2/3，病部褪绿黄化，褐色干枯脱落。防治以上病害除加强肥水管理外，冬天应剪掉病枝病叶，湖南2公分月季树，清除地下落叶，减少初侵来源，发病时应采取综合防治，并喷洒多菌灵、托布津等杀菌药剂。

树状月季管理要点有哪些？

1、阳光要充足

树状月季一般种在庭院和露台比较多，这是因为月季花是需要充足光照的鲜花，而室内的光线是无法满足它的生长。所以在保证充足光照下，夏季正午的时候注意还要遮阴。

2、温度要适宜

月季树生长的适合温度保持在15-25 之间，这样对它生长更有好处。虽然它有一定的耐寒能力，但冬天的时候也要注意防寒，别让它受冻。

3、浇水勿过多

一般来说地栽的树状月季不太需要浇水，只在长时间不下雨的情况下，将它周围的花土浇湿就可以。但如果是盆栽，要注意及时补水，以免它缺水。

4、施肥应适当

在生长季，应当每10天左右追施一次花肥，来提供养分。在花期之前，还要再增施1-2次磷肥，来助它开花。

5、通风要良好

树状月季养护以露天为好，需要通风良好的地方，不通风会造成病害，比如红蜘蛛、病等，这里要说一些树状月季的一个大优点：树状月季的花冠比一般花卉离地面远，病害的机会比其他的花卉少很多！但是也要避免大风直吹，否则很容易把嫁接口吹断，所以同时也需要外界的支撑。

6、修剪应合理

月季树需要进行合理的修剪，才能保持好的株形和冠型。花后要及时修剪，湖南2公分月季树现货供应，剪除弱枝，为下一次开花做准备。

盆栽月季冬天怎么养护？

1、冬花能不能留？有时候盆栽的月季，有一朵两朵花在那里迟迟不放。很多人喜欢留着等他开。这样也行，但是第二年上花苞迟而且花苞少。

2、何时修剪？什么时候修剪合适，一般是叶子全部自然落光就可以了。叶子落光了，代表叶子的养分全部输送给根部了，而且剪掉以后，年前不会萌出新芽消耗养分了。月季叶子落光一般是冬至以后，叶子不自然落光，不要修剪，首先是养分储存没有完成，其次，易萌芽消耗养分，影响来年上花的品质。萌芽一般在立春前后。萌芽之前需要完成修剪，春季萌芽之后再剪，养分流失，白白耗掉，影响开花的开品与开花的时间。所以月季冬季修剪的时间为12.22-来年2.4日。叶子落光以后，新芽萌动以前。

- 3、怎么修剪?灌木月季每个壮枝留取3-4个芽点，前端剪掉。芽点多了，上花率低，芽点少了，容易一枝多头，降低观赏效果。，弱枝枯枝剪掉。藤本弱枝、枯枝剪掉，剪掉多余的乱糟糟的部分。下图为修剪以前和修剪以后的对比。当然也可以根据自己的喜好修剪。大致方向是如此。
- 4、施肥。可以施腐熟过的粪肥，或者扣盆，四周的土弄掉一部分，湖南2公分月季树基地，然后放盆里，四周用园土加粪肥封实就行。也可以埋鱼肠、鱼头，深一点，适量。
- 5、如果冬天室外冻不死，就放室外，这样来年的新芽会坚实饱满茁壮。

湖南2公分月季树-春诚月季3到10公分-湖南2公分月季树基地由方城县春诚月季种植基地提供。方城县春诚月季种植基地（www.ccyueji.com）为客户提供“月季苗,月季批发,月季树,大花月季,月季”等业务，公司拥有“南阳春诚月季”等品牌，专注于花木等行业。欢迎来电垂询，联系人：雷经理。同时本公司（www.ccyueji.cn）还是从事南阳月季树，南阳月季树基地，南阳月季树批发的厂家，欢迎来电咨询。