

中桃金魁桃树苗特点分享

产品名称	中桃金魁桃树苗特点分享
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

产品详情

中桃金魁桃树苗，早熟新品种桃树苗中桃金魁。郑果所推出额早熟黄桃新品种中桃金魁桃树苗具体表现分享。

中桃金魁果实圆整，果顶凹顶，成熟时间早，山东地区6月初成熟；果个大，单果重250-300g，大果400g；外观漂亮，套袋果果面金黄色，不套袋果面90%以上着鲜艳红色，果肉黄色；硬溶质，粘核，较耐贮运；风味甜香，可溶性固形物12-13%。自花授粉，坐果率高，丰产性强。

桃树根系浅，结果早，树体衰弱快，如果栽培管理中不按需肥要求施肥，肥料用量、氮磷钾配比、施肥时期方法不合理，会导致产量和果实品质下降，甚至树体早衰。

对氮肥利用率高且特别敏感 桃树对氮肥的利用率为50%，高于磷肥（25%）和钾肥（40%）。对氮肥的敏感表现在幼树期和初结果期，如施氮肥过量，易出现枝条徒长、难成花、花芽质量差、投产迟、流胶病严重等现象；盛果期需氮肥多，如果氮肥不足，易引起树体早衰，盛果期缩短，但果实生长后期氮肥又不能过多，否则果实味淡、品质差。

需钾量大 桃树对钾的需要量大，特别是果实发育期，钾对增大果个、提高品质有显著作用，所以壮果肥中钾的比例应高于氮，果实发育期还应叶面喷施磷酸二氢钾或硫酸钾。

对中微量元素比较敏感 尤其对钙、铁反应更为突出。缺钙初期叶片上出现红褐色斑点，后期发黄逐渐干枯，根系生长受阻，幼根腐烂坏死，果实软腐；缺铁时叶子发黄发白褪绿。缺硼时幼叶小，扭曲变厚呈革质；缺锌时枝顶出现丛生小叶，果实品质下降。

不同生长周期需肥各有特点 桃树的年生长周期包括幼树期、初果期、盛果期和衰老期。幼树期（从定植到第1次开花结果）为营养生长阶段，需肥量少，但对肥料非常敏感，要多施有机肥，施足氮磷肥

，适当配施钾肥；初果期（从第1次开花结果到形成一定产量之前）为生长结果阶段，主要是促进花芽分化，施肥以磷肥为主，配施钾肥；盛果期（从有一定经济产量到较高产量并保持稳定）为果实品质最好阶段，要以促进优质丰产并确保来年丰产、维持树体健康长势为管理目标，施肥要氮磷钾配合，后期提高钾肥比例，同时注意补充中微量元素；衰老期在管理上应以促进更新复壮、延长盛果期年限为目的，施肥以氮肥为主，适当配施磷钾肥。