

# 南昌樱桃李子苗 樱桃李子苗种植技术 超顺苗木

产品名称	南昌樱桃李子苗 樱桃李子苗种植技术 超顺苗木
公司名称	泰安超顺苗木专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区马庄镇北苏村
联系电话	13953803397

## 产品详情

青脆李李子苗只开花不结果或少结果一般由以下原因引起

- 1)青脆李李子苗花期遇低温或阴雨天导致授粉不顺，授粉率下降。
- 2)缺少一定的授粉品种。多数李品种属于自交，即同品种或同朵花中的花粉不能受精，亦就不能成果。
- 3)青脆李李子苗树势过旺，抑制了植株的生殖生长，导致少开花，少结果。

针对上述原因，可采用以下措施提高授粉率：

- 一、在种植青脆李李子苗时配置一定数量的传粉品种。
- 二、盛花期及幼果期各喷一次0.3%硼砂液+0.3%尿素+0.2%磷酸二氢钾。
- 三、夏季适当控施氮肥，增施磷钾肥，控制树势，促进生殖生长。

四、人工辅助授粉：

- 1)花粉采集：采集含苞待放或初开的花朵，剥下花粉粒放在干净白纸下，用电热板或普通灯泡照烘，使温度保持在20-25摄氏度，待花粉开裂散出黄色花粉，筛去花粉壳便收到纯净花粉。
- 2)授粉时间：人工授粉以开花后4小时内完成效果较好，迟不超过开花后48小时。
- 3)授粉方法：花粉中加入适量滑石粉(花粉：滑石粉=1:3)或淀粉拌匀放入瓶中待用。授粉。授粉时，可用毛笔，或软橡皮长7-8厘米的14或16号铅丝，一端套上一段1厘米长的自行车气门小橡皮做成的授粉器授粉。

此外，有条件的地方，可采用果园放蜂，提高授粉率，一般一亩需放蜂一箱。小面种果园，亦可采用挂花罐的办法，即在初花期剪取授粉品种的花枝，南昌樱桃李子苗，插在瓶、罐的水中，再挂在需要授粉的树上，每株挂1-2个，并经常调换挂罐位置，使全株授粉均匀，从初花期到盛花期连续挂两次，樱桃李子苗种植技术，青脆李李子苗座果率明显提高。

李树品种很多，樱桃李子苗批发，在我国南北方适应性较好的早熟品种有红美人、亚李一号、日本李王、美丽李、安农美李、日本太阳神、玫瑰皇后、圣玫瑰、大石大玉以及极具市场潜力的红肉红皮布朗李、澳洲红肉李等。中晚熟大果形品种主要有黑琥珀、安哥诺、皇家宝石、美国晚熟大李、贵凌、以及女神等西梅品种。生产上可根据各品种性状，黑宝石李抗病性较差，选择在黄河流域干燥冷凉的气候条件下建园。在长江流域建园栽培黑宝石品种的一定要选土壤有机质量2.0%以上的土壤。选择2-3个品种栽植。

李树栽植选择土质肥沃、疏松的土壤建园。选择土壤性质较差的岗、坡地建园的，建园前后要加强对土壤改良，提高肥水管理水平。建园时按株行距3-4×4-5米(亩栽33-56株)拉线定点，确定好树穴位置，并整成墒。墒沟要深，一般要有20-30厘米，以利雨天排水。

栽苗前先在栽树位置打好定植穴，穴的长、宽、深分别为80×80×60厘米，土壤性质较差的岗、坡地深度要挖至80-100厘米。地下水位较高的地区，如湖北的江汉平原，树穴的深度要浅一些，甚至只在地表挖一20-30厘米深的小坑栽苗。苗木栽下后从四周取土将根系包起来成馒头状。无论树穴深浅，栽植前均需施足基肥。基肥种类和标准、办法，均可参照安农水蜜桃栽培技术要求进行。

## 一、土肥水管理

正常的土肥水管理可参照桃树进行，但李子树，尤其是国外布朗李，如黑宝石品种，更应重视施基肥和疏松土壤，使土壤有机质含量不断提高，否则园子管理就困难，就难以收到的李果。生产上每年秋冬季亩施土杂肥(或圈肥、厩肥)的量一定不能少于每亩10000公斤，每株约占100-150公斤，甚至更多。土壤肥力好的园子或幼树每株也不能少于50公斤。基肥中如果混有饼肥或鸡、猪粪肥等牲畜类肥料，施用量可适当减少一点，但所混牲畜粪一定要先充分腐熟，施用时要与土杂肥充分拌匀，切不可以用饼肥或鸡粪肥等替代土杂肥，这一点对黑宝石李品种十分重要。

李园在干旱时要注意抗旱，特别是中晚熟品种李园。尤其在果实膨大期，缺水对产量和树势影响极大。在山坡地建园可利用地势建一水塘，拦蓄雨水水坑。

## 二、整体、修剪技术

### (一)整体修剪

李树可选择自然圆头形和细长纺锤形树形进行整体修剪。自然圆头形树形保留有中心干，基部选留3-5个主枝，无第二层主枝。主枝上依次配备侧枝，侧枝上着生结果枝或结果枝组及营养枝。一般成枝率较高、分枝力较强的品种，如安哥诺、圣玫瑰、皇家宝石、日本李王、亚李一号等较适于采用自然圆头形，整体修剪过程中要多利用拉枝手段，使主枝开张，缓和树势，促进早果。

细长纺锤形树形较适用于萌芽率高，但成枝率低，即树体枝干分枝少的品种，如黑宝石美丽李、美国晚熟大李等品种，这种树形干高50-60厘米，树冠高3-3.5米，中心干上着生10-12个主枝(或结果枝组)，主枝

与中心干的夹角要大一些，在65-75度为宜，也不能太水平，否则挂果后主枝将要下垂，造成树势。主枝间的垂直距离应保持在10-15厘米左右，但同一侧面的主枝垂直距离不能少于50厘米，下层主枝长1-2米不等，上层主枝逐渐缩短，上部呈宝塔状，全树上下呈纺锤状。

需要指出的是适于细长纺锤形树形的李品种。如黑宝石、美国晚熟大李等，整体修剪过程中可采取先短截促发枝条，而后长放拉枝开张角度的办法，既可提早完成树形，也有利于提高早期产量。

## (二)修剪

李树修剪要根据树龄、树势和品种习性来分类进行。一般幼树宜轻剪长放，除几个主枝延长头和侧枝延长头必须短截(留外向芽)之外，其余枝条一般长放不剪，以促其形成花芽。其中对成枝力强(发枝多)的品种，如安哥诺等，应多疏枝，即在年冬季修剪时留足4-5主枝外，中心干上的多余枝条要去掉(疏除)，以防止幼树主枝过多，扰乱树形，影响挂果。对成枝力弱(发枝少)的品种，如黑宝石、美国晚熟大李、美丽李等，在幼树修剪时，年冬季可能会出现主枝数量少的问题，樱桃李子苗哪里卖，可适当对其进行短截，促发新梢后作主枝培养。经2-3年，树冠和主枝数量均培养到位后，可作长放处理，以促进枝条尽快转化成花、挂果。幼树整提修剪和修剪过程中还应多采取绳拉、砖坠的办法，以开张主枝角度，尤其是黑宝石、美丽李等成枝力不强，且枝条易抱合生长的品种，开张角度，缓和枝势，促进成花，对提高早期产量十分有效。

进入盛果期的李树，要注重调节营养生长与生殖生长之间的关系，防止树体过早老化。要控制产量，适当重短截，以增加新梢生长量。保持树体活力，确保丰产稳产。

李树苗春栽有哪些基本要领?

### 一、苗木假植

苗木运到后，如不及时种植可先进行假植，选择房后背阴处挖沟，一般沟深40公分、宽80公分，长度根据苗木多少而定。如土壤干燥，先灌透水，待水透后再挖沟。把苗木剪到定干高度以上约10公分，解开捆扎苗木根系的绑绳，将苗木倾斜放置，与沟底呈45度角。把根系均匀地排列在沟内斜面上，然后将根系覆土盖严。

### 二、株行距栽植

苗木株行距因地势、土壤类型、树种、砧木等而有所不同，土壤瘠薄的山地、荒滩或使用矮化砧木的苗木可以略密植，平原、肥沃土壤可稀植。

### 三、穴、沟准备

定植穴深60~70公分，直径60~70公分，栽植穴的大小也要根据土质好坏来决定，土质好的挖穴，土质不好的要挖大穴，表土和心土要分开放置，表土和腐熟好的土粪掺匀后填入树穴下层，心土放在表层。根区和施肥区间隔20公分，严禁施鲜粪作底肥，以免伤根。

### 四、苗木栽植

栽植时间落叶果树一般以冬季为宜，常绿果树以春季为宜，定植时要做到规格化，达到横竖成行。定植时嫁接口应露在地面，根系要伸展，然后培土、踏实、浇水，水渗后再封穴，以利保水。

## 五、苗木定干

果树苗木栽植后要及时定干，多风地段宜矮化栽培。

南昌樱桃李子苗-樱桃李子苗种植技术-超顺苗木(诚信商家)由泰安超顺苗木专业合作社提供。泰安超顺苗木专业合作社(www.tachaoshun.com)是从事“梨树苗，李子苗，桃苗，苹果苗，葡萄苗”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：苏经理。