

早红桂花 肥东县桂花 庄顺果树苗基地

产品名称	早红桂花 肥东县桂花 庄顺果树苗基地
公司名称	长丰县庄顺果树良种有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县庄墓镇
联系电话	13605648812

产品详情

立即对果树苗疏果定果对自花结实率高的种类，应立即疏花疏果，越快越高；对无蜂花粉或者自花结实率低的种类，不疏花只疏果。为了更好地让大棚樱桃坐果，种植户都会分多次进行点花，果农一定要把握好间隔时间、点药，盛花期这一遍实际上就是坐果药，坐果药点完之后第二遍实际上就是膨果药，晚霜到来前白天可用7500~15000倍碧护喷雾新梢，也可用防冻剂喷雾预防冻害；晚上当气温降至1℃时，在每亩猕猴桃园放置4~5个湿柴草堆点燃熏烟，熏烟是防晚霜冻害有效的方法之一。

冻害桔园开春后应中耕松土、开沟排水，促发新根。对冻害比较轻的植株，要及时施肥，薄肥勤施，以氮肥为主。冻害发生比较重的植株，停止施用芽前肥，视新芽的萌发、抽梢后，进行施肥，薄肥勤施，以氮肥为主。做好猕猴桃春季管理可为全年管理起好步，早红桂花，适时灌1水。冬春季北方干旱少雨，猕猴桃要高产，春灌是关键。早春土壤解冻后应灌1水1次，状元红桂，补充土壤水分；加强肥水管理。基肥：头年秋季采果后未施基肥，翌年春季萌芽前要补施。以土杂肥、圈肥、鸡粪等有机肥为主，混加少量氮肥。施肥量标准一：每产1千克果施2千克土杂肥，肥东县桂花，并混加少量尿素。

加强树体护理。冻后树体的抗寒能力进一步下降，枝干容易发生日灼，还应当及时做好枝干的保护、培土覆盖等措施，以减轻冻害的危害。正常值的苗根，外皮颜色新鲜，横断面呈乳白色；霉根外皮为褐色或黑褐色，手一接触立刻裂开。要注意查验果树苗木是不是失水。清扫园内及园外10米内杂草、落叶、枯枝等易藏病虫害的杂物。用刀刮除树干上轮纹病斑及老翘皮，涂抹石硫合剂、多菌灵、50倍双效灵或甲1基托布津。

早红桂花-肥东县桂花-庄顺果树苗基地由长丰县庄顺果树良种有限公司提供。行路致远，砥砺前行。长

丰县庄顺果树良种有限公司 (www.yumiaodi.cn) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!