

山林月季 月季

产品名称	山林月季 月季
公司名称	南阳市卧龙区山林月季种植专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区蒲山镇姚亮村七组
联系电话	13838785333

产品详情

月季病虫害如何防治

危害月季的叶片，造成叶片枯萎。

症状：三种类型： 型。 黑斑型。 穿孔型。

病因：真菌中的子囊菌类。

发生特点：感病叶片，先出现小白斑，褐斑，后逐渐扩大。叶片变型卷缩。一般阴温地块易发病。弱小植株易发病。

防治： 创造通风透光环境，大花月季，加强管理，月季批发，使植株生长健壮。 早春发芽时喷3~4Be石硫合剂，月季，以越冬病菌。 发病时可喷50%代森锌，70%托布津，或50%多菌灵等800~1000倍液。以控制其蔓延。 及时摘除病叶，集中烧毁，防止扩展。

月季老化的防治与复壮

月季老化现象常表现为枝条细弱而少花，修剪后枝条干枯，叶片、花瓣质薄而色淡，叶片黄化脱落，抗病虫能力弱等，对此应从水肥、修剪、养护等方面查找原因，对症下药进行防治。

一、涝害 其表现为叶片黄化脱落，枝条枯萎，部分根系腐烂。有酒糟味。对受害严重的植株或涝以排除者，应重剪后掘起，抬高地势后再行栽植，受害轻者可用植株基部堆土的方法，激发根颈部产生不定根，从而起到缓解的目的。

加强设施管理：定期检查温室大棚的隔离措施，月季，控制害虫的侵入；温室大棚要有足够的通风除湿能力；合理的灌溉系统，避免弄湿植株；及时清洁棚膜，随温度变化及时通风换气和排湿。

药剂防治：使用化学防治时尽可能采用熏蒸(硫磺熏蒸、烟雾熏蒸)，采用喷雾方法时也要尽量选用不易留下污渍的。应喷洒在植株20厘米以下的部位，避免对切花月季的直接污染。切花月季对克螨特、菊酯类较敏感，容易出现药害，在防治时要慎重使用。

山林月季-月季由南阳市卧龙区山林月季种植专业合作社提供。南阳市卧龙区山林月季种植专业合作社（www.shanlinyueji.com）是一家从事“花卉,月季树批发,树状月季,苗木种植及销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“山林月季”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山林月季在花木中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！