

东营良杂仔猪 良杂仔猪出售 义民牧业

产品名称	东营良杂仔猪 良杂仔猪出售 义民牧业
公司名称	莒南县义民牧业服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市莒南县
联系电话	15853950176

产品详情

维生素A有很多重要的作用，因而又称为保护上皮维生素抗维生素、抗干的眼病维生素、生长维生素。维生素A保护呼吸系统、消化系统和生殖气官皮肤和粘膜的上皮细胞，防止感。另外，维生素A对视力起决定性作用。好振母猪维生素A供给不足时，会造成仔猪畸形和生长受阻。初生仔猪只能从母如中获得维生素A。

维生素A对繁殖有重要功用

植物性饲料中维生素A以胡萝卜素的形式存在，猪体将胡萝卜素按1:500的比例转化成维生素A（1毫克胡萝卜素产生500国际单位维生素A，1国际单位维生素A等于0.3微克）。

分娩舍母猪的生理特点和管理要点

分娩舍母猪的生理特点和管理要点：

(1)母猪由于皮厚毛长，皮下脂肪层较厚，但无汗腺，容易发生热应激，求购良杂仔猪，因此在保证小猪小环境温度时，分娩舍温度不能太高，当舍内温度超过30 时要采取滴水或其他措施给母猪降温。

(2)母猪泌乳规律：

泌乳量的变化：在分娩后处于增加趋势，3周龄左右达泌乳高峰，后逐渐下降。

结构特点：母猪的没有乳池，不能随时排乳，必须定时排奶。

猪乳成份变化：分初乳和常乳。初乳指分娩后3天内的乳，主要是产后12小时之内的乳以后为常乳。初乳维生素C含量高，还含有，又有镁盐，良杂仔猪出售，有轻泻性，可促进胎粪的排出，且浓度较高，有利于消化道的活动。常乳不具备这些，故初乳是仔猪不可替代的食物。

不同泌乳量不同：一般认为前面的几对奶头比后面的泌乳量高。

泌乳次数：表现为前期多，后期少，白天少于夜间。

仔猪断奶方法：可采取一次性突然断奶，把母猪突然赶走，仔猪留在原舍。母猪在断奶当天停止喂料（喂水），然后恢复空怀期的饲料量及配料。仔猪应在7日龄左右开始诱食，并设小水槽，断奶后就会很快适应吃料，东营良杂仔猪，饲料可干喂，也可湿喂。仔猪注意事项：仔猪的饲料应满足生长发育的需要，一般在仔猪饲料内应多配黄豆、豆饼、鱼粉等蛋白质饲料，使饲料的粗蛋白质水平在22%以上。可添加适量饲料酵母，有甜味的物质，以提高适口性。黄豆必须炒熟饲喂，以免引起腹泻。人工哺育的仔猪必须加强管理，不适宜的温、湿度，恶劣的卫生条件、不适当的日粮、无规律的饲喂都有可能导致早期断奶的失败。

东营良杂仔猪-良杂仔猪出售-义民牧业(诚信商家)由莒南县义民牧业服务中心提供。莒南县义民牧业服务中心(yiminzizhu.com)为客户提供“二元,三元,大白,长白,苏太母猪,太湖原种,梅山母猪,杜洛克”等业务，公司拥有“二元,三元,大白,长白,苏太母猪,太湖原种,梅山母猪,杜洛克”等品牌，专注于苗猪等行业。欢迎来电垂询，联系人：张经理。