

珍稀板栗苗批发

产品名称	珍稀板栗苗批发
公司名称	泰安市果之语农业科技有限公司
价格	3.00/棵
规格参数	品牌:果之语农业 板栗苗:嫁接板栗苗 产地:山东泰安
公司地址	泰安市高新区北集坡镇
联系电话	18364868333

产品详情

珍稀板栗苗批发 嫁接板栗苗批发：华丰板栗苗、华光板栗苗、红栗1号板栗苗、黄棚板栗苗、泰山薄壳板栗苗、实生板栗苗、一年板栗苗、两年板栗苗、嫁接板栗苗、板栗树苗、板栗树。免费提供板栗苗种植技术。“主要是因为很多人找不到这里，不像以前，不管是批发还是零售，外地顾客从民东上高速路过甲尔坝就可以购买。”对于二级苗，我认为应该有两条路可以走，一是地价进行抛售，二是用来进行嫁接金枝槐和金叶槐，这是比较可行的一条路子。每当我们走进农场，农场主们个个喜笑颜开。8月10日消息：炎炎夏日，酷暑难耐，如果能放一盆绿色盆栽在屋里，是不是会觉得一下子清凉了不少?记者昨天在一些超市、花鸟市场里看到，随着盛夏脚步的临近，具有驱蚊、吸尘等功能的夏令小盆栽俨然成为“主角”。

双季板栗种植技术要点 一、建园密度株行距3×3米或3×4米，每亩56株或74株。

二、定植1、挖坑种植坑为宽60 - 80公分，深度60公分以上，方坑圆坑均可。2、基肥定植基肥为20 - 40公斤腐熟农家肥或肥，加入0.5 - 1斤钙镁磷肥，1斤花生麸（可用可不用）。如农家肥不足，可用5 - 10公斤农家肥 + 表层肥土 + 1斤生物肥 + 0.5斤钙镁磷肥 + 1斤花生麸（可用可不用）。3、定植定植前，用apt3号生根粉10万倍稀释液调制的泥浆水沾根，再定植。apt3号生根粉必须先用酒精溶解再与水混合。定植时，先将表土与肥料边混合边放入坑底约1/2，再盖上新土，在回填土达2/3时，可将钙镁磷肥与土边混合边回填。起果盘高度15 - 20公分。回填后，挖一小坑，将果苗种下，并将果苗根系整理整齐，不要向起，根系周围回填土必须细碎，以利于根系与土壤的接合，成活率。定植深度，以果苗原入土深度为宜。回填完毕，将苗向上提一提，再压实土壤，然后灌定根水。三、水板栗树根系发达，有菌根，比较抗旱，不耐涝，灌过2 - 3次定根水后，基本靠天雨，不是连续旱情，可以不淋水，但有水，则生长量及产量有较大。水的重要期为1、花前期，也就是4 - 5月份，此时好不要过早，否则对开花有影响。2、产果期，9 - 11月，此时缺水会落果和果实偏小。但此时适逢我区秋旱，可以使用“固体水”等保水剂抗旱和保水。是在树冠滴水线位置挖一环形沟，深30公分左右，将保水剂与细土混匀后施入沟中，然后浇足水，用土将沟填平，以干品计，每树施用量幼龄树20 - 30克，成年树30 - 40克。也可穴施，是在树干周围均匀打孔或挖穴，深度20 - 30公分，将保水剂与细土混匀后分散到每个孔或穴中，浇透水后覆土。四、土壤土壤越疏松，板栗根系生长越好，板栗树一年需松土2 - 3次，一般在夏、秋季，具体说是在次采果和第二次采果后，进行中耕松土锄草，结合施肥同时进行，松土深度20公分左右，范围为树冠左右20 - 30公分。五、肥1、一龄树定植出芽后，可用1000倍奥普尔进行叶面、地面喷施次肥。过20天加入0.3%尿素再喷一次。由于在4 - 6月份，板栗根系都还吃不到土壤中的基肥，在5 - 6月可撒施一次硫酸钾型复合肥，用量50 - 60克/株或生物肥100 - 120克。施复合肥后，须用细土将复合肥覆盖，以免复合肥蒸发***果

树，撒施位置为果树树冠滴水线向外20公分处。如需采收当年果实，需在7月份叶面喷施1 - 2次500倍硼砂水和广西化工院产的保果灵或产南风赤1000倍保花保果和提供打果所需微量元素。幼果期、果实期各施一次500倍奥普尔叶面肥。11月份采收完后的板栗，须施一道产后肥。沿果树树冠在树的东侧或南北侧开挖深50公分、宽20公分、长30公分坑，交杂草先填下坑再将5 - 8公斤腐熟农家肥加上250克生物肥与土边混边回填，后用300倍奥普尔稀释液每株5斤水泼入即可。

2、第二年树在4月份施一次花前肥，每株树地施200克生物肥，撒施同前。由于双季板栗为连续开花，连续挂果，对硼、锰、磷、钾、镁、钙的消耗也相应较大，因此，从4月份起，每2个月施一次叶面肥，肥的配比为：硼砂500倍 + 保果灵一支 + 奥普尔500倍。次采果和第二次采果后结合松土地施农家肥5公斤，生物肥250克2次。11月份采收完后的板栗，施一道产后肥。沿果树树冠在树的东侧或南北侧（上一年东西，今年南北）开挖深50公分、宽20公分坑，将杂草先填下坑再将10公斤腐熟农家肥加上500克生物肥与土边混边回填，后用300倍奥普尔稀释液每株5斤水泼入即可。

六、修剪同病虫害及缺素症

1、修剪一般幼树经三年左右时间可完成“自然开心形”或“主干疏层形”树形、投产后分生长期、休眠期进行。生长期：4 - 11月，春梢萌发后抹去萌蘖，春梢30厘米长摘心，选留2 - 3个分布均匀、方位、生长势强新梢，夏梢抽发后行摘心，充实的结果母枝和结果枝。休眠期：12月 - 次年3月前剪去病虫枝、密生枝、纤细枝、交叉枝等对弱枝采取多疏少留，对强树旺枝则多留少疏，徒长枝酌情剪留。对幼树、新梢中的直立枝强行拉枝，可缓和顶端优势，促进侧芽萌发及花芽分化，有利于早结丰产。成年树及高接树适当进行回缩，以促发新梢，成立体结果。疏花疏果：第二季果往往偏多偏小，可在8月中旬做疏花疏果，1个果枝保留2 - 5个雌花或幼果，将此后开花全部抹去，使两季结果平衡并大果型。